Remarque. On déterminera complètement les coefficients de M_1 ; car, en vertu de la I propriété du n° 6, la réduction de l'intégrale à la forme énoncée dans le n° 5, ne peut être effectuée que d'une seule manière.

8. Pour le cas, où l'intégrale du n° 1 s'exprime sous forme finie, la réduction, démontrée ci-dessus, est équivalente à la séparation du terme algébrique de la valeur de l'intégrale (voir n° 6, I).

C'est à M. Tchebycheff qu'on doit le premier procédé pour la séparation du terme algébrique de l'intégrale s'exprimant en termes finis. La première démonstration du dit procédé est donnée par M. Piuma (Annali di Matematica, 1861).

Péterhof, le 10. février 1889.

Berichtigung zu dem Aufsätze „Ueber Productdarstellung eindeutiger, linearperiodischer Functionen“ von H. Stahl in Tübingen.

p. 292 Z. 17 v. o. statt: „Das von demselben ... zum Ziele führt“ ist zu lesen: Das bekannte, von Herrn von Mangoldt angewandte Verfahren führt auch im allgemeinen Falle zum Ziel. Dasselbe besteht darin, dass man die logarithmische Ableitung der zu bildenden Function mit Hilfe der 0¹ und ∞^1 -Punkte darstellt durch Partialbrüche in Verbindung mit gewissen Zusatzfunctionen, welche die Convergenz der Summe bewirken. Durch Integration erhält man alsdann die Function selber, gebildet aus den 0 und ∞ -Punkten, während die Zusatzfunctionen die Exponentialfactoren bestimmen, welche die Convergenz des Products bewirken. Die Behandlung des allgemeinen Falles erfordert nur einige Sätze aus der Theorie der Abel'schen Integrale, die ebenso wie für die Riemann'sche Fläche auch für das „Fuchs'sche“ Kreispolygon gelten.