Um die Ergebnisse, die bei 0° C mit stark bewegten Keimen gewonnen waren, noch weiter zu stützen, machte Verf. noch einige Versuche bei dieser Temperatur in anderer Anordnung, indem er zunächst im Versuchsgefäß einen Kristallkuchen ausschied, dann die übersättigte Lösung dazu brachte und unter Umrühren die Kristallisation vorstatten gehen ließ. Bei diesen mit ruhenden Keimen ausgeführten Kristallisationen konnte, da die Oberfläche der als Keim wirkenden Kristallfläche kleiner war, als bei den mit bewegten Keimen ausgeführten Versuchen, die stärkere Konzentrationsabnahme im ersten Augenblick nicht beobachtet werden. Dagegen zeigte sich in Uebereinstimmung mit den früheren Versuchen, daß bei 0° die Reaktion nach der zweiten Ordnung verläuft. Der Uebergang des Kristallisationsvorgangs von einer Reaktion zweiter Ordnung liegt nach den Versuchen des Verf. bei ungefähr 13° C.

Es wurden nun noch eine Reihe von Auflösungs- und Kristallisationsversuchen in Kaliumsulfatlösungen unter Zusatz von Farbstoffen ausgeführt. Während die Auflösungsgeschwindigkeit von Kristallen durch Zusatz von Farbstoffen nicht beeinflusst wird, wirkt dieser auf die Kristallisationsgeschwindigkeit stark bremsend. Diese verzögernde Wirkung beruht wahrscheinlich darauf, daß der Farbstoff dadurch, daß er vom Kristall adsorbiert wird, die zur Kristallisation erforderliche Substanz aus der adsorbierten Schicht verdrängt. Dabei wird in den Lösungen bei Anwesenheit von Farbstoff mit derselben Geschwindigkeitskonstante eine scheinbare, bei höherer Konzentration liegende Gleichgewichtslage erreicht, wie bei Abwesenheit desselben das wirkliche Gleichgewicht sich einstellt. Das Auftreten des scheinbaren Gleichgewichtes kann vielleicht dadurch erklärt werden, daß der Farbstoff mit dem Kaliumsulfat in der adsorbierten Schicht eine Art Verbindung bildet, welche sich mit ihren Dissoziationsprodukten in der Lösung, dem Kaliumsulfat und dem Farbstoff, sehr schnell ins Gleichgewicht setzt. Nur dann, wenn in der Lösung mehr Kaliumsulfat ist, als dem Dissoziationsgleichgewicht der Verbindung entspricht, kann dieses kristallisieren. Ist das geschehen, so ist das scheinbare Gleichgewicht erreicht. Dann befinden sich nebeneinander im Ungleichgewicht festes Kaliumsulfat und die Adsorptionsverbindung, und der Dissoziationsdruck der Verbindung ist höher, als der Lösungsdruck des Kaliumsulfats. Es müßte also die Verbindung freiwillig zerfallen und das Kaliumsulfat sich weiter ausscheiden. Von der Geschwindigkeit, mit welcher nun die Adsorptionsverbindung in ihre Bestandteile zerfällt, wird es dann abhängen, ob nach Erreichung des scheinbaren Gleichgewichtes die Konzentration der Lösung an Kaliumsulfat noch bis zum stabilen Gleichgewicht heruntergeht.

Grube.

Magini, R., Ueber die Messungen der Oberflächenspannung. (Rend. R. Accad. dei Lincei [3] 20, 1, 30–37, 1911.)

Verfasser studiert den Einfluß der Luft auf die Oberflächenspannung des Wassers, indem er die Methode des Maximaldruckes kleiner Blasen anwendet. Das Wasser ist frisch destilliert und gelüftet. Es geht aus den Versuchen hervor, daß nach Beseitigung aller anderen Einflüsse auch die reine Luft die Oberflächenspannung des Wassers herabdrückt.

Aequimolekulare Lösungen der Stereoisomeren: Fumar- und Maleinsäure weisen die gleiche Ober-

flächenspannung auf (0,25 n Lösungen in 95 prozentigem Alkohol).

Absoluter Aethylalkohol gibt bei 15° $\alpha = 2,378 \text{ mg/mm} = 23,33 \text{ dyne/cm}$. Bei niedrigeren Temperaturen kann man Bestimmungen in flüssigem Alkohol bis zum Schmelzpunkt (-112°) ausführen, und man bemerkt dann, daß die Oberflächenspannung eine lineare Funktion der Temperatur ist. Auch unter der Schmelztemperatur (112°) scheinen in der zähen Flüssigkeit (Glas) die gefundenen Werte auf derselben Geraden zu liegen.

Vz.

Ebler, E., und Fellner, M., Ueber die Adsorption radioaktiver Substanzen durch Kolloide. Methoden zur Anreicherung und Isolierung radioaktiver Substanzen. (Zeitschr. f. anorg. Chem. 78, 1–30, 1912.)

Verfasser zeigen in dieser sehr gründlichen, durch quantitativ-experimentelles Material reichlich gestützten Untersuchung, daß den Gelen (hier insbesondere dem SiO_2 -Gel) eine ganz hervorragende Fähigkeit zur Adsorption radioaktiver Substanzen zukommt. Es sollen hier nur in großen Zügen einige bedeutungsvolle Allgemeinergebnisse der vorliegenden Arbeit behandelt werden. Genaueres muß in der Originalabhandlung nachgelesen werden¹⁾.

Von großer Wichtigkeit für die Anreicherung bzw. Trennung radioaktiver Substanzen von anderen Beimengungen erwies sich die „fraktionierte Adsorption“, die darin besteht, daß man z. B. Lösungen, welche in der Volumeinheit geringere Mengen radioaktiver Substanzen enthalten, mit Kieselsäuregel [verwendet wurde ein solches der annähernden Zusammensetzung $4 \text{ SiO}_2 \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$ — also mit etwa 18–19 Proz. Wasser²⁾] schüttelt, hierauf die Kieselsäure abdekantiert und mit Flußsäure verjagt, dann eindampft, den erhaltenen aktiven Rückstand löst und die Lösung mit neuer Kieselsäure behandelt, ein Verfahren, welches man bis zur gewünschten Reinheit der Präparate öfters wiederholt. In vielen Fällen ist diese Trennungsmethode (z. B. vom Barium) den gewöhnlichen analytischen Methoden, die häufig mit nicht unbedeutenden Materialverlusten verbunden sind, vorzuziehen; denn sie ist einfacher und führt in größeren Radioaktivitätsintervallen zum gleichen Ziele.

Die experimentelle Bestimmung der vom SiO_2 -Gel adsorbierten Mengen radioaktiver Substanz im Vergleich mit dem nicht adsorbierten Anteil erfolgte nun in der Weise, daß Verfasser die Aktivität des aus dem Gel nach obigem Verfahren gewonnenen Rückstandes, sowie die Aktivität des Eindampfrückstandes der überstehenden Flüssigkeit (cf. oben) elektrometrisch prüften (Wulf'sches Quarzfadenelektrometer mit direkt aufgesetzter Ionisierungskammer). Die Aktivität des adsorbierten Anteiles³⁾ überwog die des nichtadsorbierten jedesmal erheblich. Dieser hier für das Experiment ausgenutzten Adsorptionsfähigkeit des Gels der Kieselsäure für radioaktive Stoffe kommt auch in der Natur eine große Bedeutung, u. a. bei der Verteilung der Radioelemente in radioaktiven Mineralquellen auf die verschiedenen Quellenbestandteile⁴⁾, zu (Gas, Wasser, Sedimente, Mutterlaugen, Absätze in Quellspalten usw.). Mitwirkend sind hierbei noch

¹⁾ Vgl. auch den in der Abteilung Chemie auf der 83. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte (Karlsruhe 1911) von E. Ebler gehaltenen Vortrag. Ref. Koll.-Zeitschr. 9, 158 (1911).

²⁾ Das Gel wurde vorzugsweise durch Hydrolyse von Siliziumtetrachloriddampf gewonnen. Vgl. E. Ebler und M. Fellner. Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 44, 1915 (1911).

³⁾ Gemessen in Volt-Stunden.

⁴⁾ Zeitschr. f. anorg. Chem. 72, 260 (1911).