F. BOERNER: Approved Laboratory technic, 4. edit. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc. 1945. — LEIFSON, E.: J. Bact. **60**, 678 (1950). — MAGNUSON, H. J., and J. PORTNOY: J. Publ. Health, Albany **46**, 190 (1956). — MEINICKE, K.: Hautarzt **4**, 268 (1953); **7**, 407, 540 (1956). — Arch. Derm. Syph. (Berl.) **200**, 536 (1955). — MORTON, H. E.: Amer. J. Syph. **35**, 503 (1951). — NELSON, R. A., and M. M. MAYER: J. exp. Med. **89**, 369 (1949). — PORTNOY, J., and H. J.

MAGNUSON: J. Immunol. **75**, 348 (1955). — SCHMEROLD, W.: Zbl. Bakt., I. Abt. Orig. **166**, 274 (1956). — SCHMEROLD, W., u. B. DEUBNER: Hautarzt **5**, 511 (1954). — SIEFERT, G.: Arch. Mikrobiol. **29**, 406 (1958). — SWAIN, R. H. A.: J. Path. Bact. **69**, 117 (1955). — UHLENHUTH, P., u. P. MULZER: Atlas der experimentellen Kaninchensyphilis. Berlin: Springer 1914. WUNDERLY, CH.: Die Papierelektrophorese. Aarau: H. R. Sauerländer & Co. 1954.

STELLUNGNAHME ZU: W. GÜNDEL: „ÜBER DAS AUFTRETEN EINES SYSTEMATISCHEN FEHLERS BEI DER ERYTHROCYTENZÄHLUNG“, diese Z. **37**, 98 (1959)

Von

N. KLEINE

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Br. (Direktor: Professor Dr. Dr. hc. L. HEILMEYER)

Der von GÜNDEL¹ beschriebene Effekt, daß bei größeren Erythrocytenkonzentrationen die Zahl der ausgezählten Teilchen unter dem auf Grund von Verdünnungsreihen tatsächlichen Sollwert liegt, wird durch teilweises Übereinanderliegen der Erythrocyten nach der Sedimentation erklärt, was auf Grund statistischer Berechnung möglich erscheint. Hierzu ist jedoch von der Annahme auszugehen, daß die Erythrocyten als Scheiben mit ihrer maximalen Projektionsfläche sedimentieren. Dies ist aber auf Grund von Strömungsgesetzen nicht der Fall, und man kann sogar mikroskopisch sehr schön beobachten, wie die Erythrocyten, sich um beliebige Achsen drehend, sinken. Ferner bewirken die bereits liegenden Teilchen eine Ablenkung der sedimentierenden Zellen auf noch nicht belegte Gebiete auf Grund der Strömungsverhältnisse in nicht idealen Flüssigkeiten, was für alle Suspensionsmittel zutrifft. Somit ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit für das zufällige Übereinanderliegen der Teilchen vernachlässigbar klein. Weiter ist anzuführen, daß auch bei kugelförmigen Teilchen wie sie z. B. durch Suspension von Erythrocyten in Gowerslösung erhalten werden, Diskrepanzen zwischen Soll- und Zählwert auftreten. Doch ist bei kugelförmigen Teilchen aus Stabilitätsgründen ein teilweises Übereinanderliegen der Teilchen nicht möglich. Zwei übereinanderliegende Kugeln befinden sich nämlich im labilen Gleichgewicht.

Man kann unter dem Mikroskop ganz einfach nachprüfen, ob Erythrocyten in der Zählkammer übereinanderliegen, indem die Teilchen mit einer punktförmigen Lichtquelle bei relativ großem Abstand des Kondensors vom Objekt beleuchtet werden. Man sieht dann nämlich auf Grund der den Erythrocyten eigentümlichen Biskuitform je nach Höheneinstellung des Objektivs eine kreisrunde Brennnlinie des Erywulstes oder einen virtuellen Brennpunkt des konkaven Zentralteiles der Erythrocyten. Wenn zwei Teilchen übereinanderliegen, so müßte dies eindeutig durch massive Veränderung der jeweiligen Brennweiten zu erkennen sein. Ein derartiger Effekt konnte aber bisher nicht beobachtet werden.

Der Vorschlag von GÜNDEL, die Schichttiefe der Zählkammern auf die Hälfte und mehr herabzusetzen, entspricht nicht dem Stand der Technik, da die

serienmäßigen Zählkammern eine Fertigungstoleranz der Schichthöhen von $\pm \frac{5}{1000}$ mm haben, entsprechend $\pm 5\%$ bei $\frac{1}{10}$ mm Solltiefe.

Wird die Schichttiefe verringert, so steigt damit der Fehler von bereits $\pm 5\%$ auf $\pm 10\%$ u. m., wenn obigem Vorschlage Folge geleistet wird. Die Kammern genauer herzustellen, würde eine wesentliche Verteuerung bedeuten und wäre auch ganz sinnlos, da die Auflage des Deckglases ebenfalls im allgemeinen eine Schichttiefenänderung von mehr als $\pm \frac{5}{1000}$ mm bedingt². Dieser Fehler könnte zwar wesentlich durch Verwendung einiger Millimeter starker Deckgläser verringert werden, doch ist dann ein Objektiv mit größerem Arbeitsabstand zu verwenden, wodurch eine kleinere Vergrößerung bedingt ist und somit die Verdünnung statt bisher 1:200 von 1:2000 benutzt werden muß, damit eine Zählung überhaupt möglich ist.

Zur Erklärung der Differenz zwischen dem Sollwert und der ausgezählten Teilchenzahl sind schon wiederholt Versuche unternommen worden. So sind z. B. beim Vergleich von Kammerzählungen und elektronischen Zählgeräten Abweichungen bis zu 10% gefunden worden³. Eine starke Abhängigkeit des Zählergebnisses von der jeweiligen Einfüllmethode konnte nachgewiesen werden. Auch nach eigenen Befunden stellt die gleichmäßige statistische Verteilung der Teilchen innerhalb der Zählkammern die größte Schwierigkeit dar. Eine befriedigende Lösung dieses Problems unter Verwendung bisher üblicher Suspensionsmittel ist bisher nicht gelungen, da die beim Einfüllen auftretenden undefinierten turbulenten Strömungen eine ungleichmäßige Anhäufung der Zellen hervorrufen.

Die besten Erfolge wurden bei eigenen Untersuchungen mit Lösungen höherer Viskosität erzielt. Hierdurch wurde erreicht, daß die Suspension langsamer und somit laminar einströmt. Photometrische Messungen über den gesamten Zählkammersteg mit einem etwa 1 mm² großen Lichtbündel ergaben bei der üblichen Methode Abweichungen bis zu 20% vom Mittelwert, wogegen unter Verwendungen von Lösungen mit höherer Viskosität die Meßwerte nicht mehr als $\pm 2\%$ schwankten.

Literatur. ¹ GÜNDEL, W.: Klin. Wschr. **37**, 98 (1959). — ² KLEINE, N., u. PLÖTNER: Handbuch der gesamten Hämatologie, Bd. II. Im Druck. — ³ MATTERN, C. F. T., F. S. BRACKETT and OLSON: J. appl. Physiol. **10**, 56 (1957).