Isolierung von kristallisiertem Koproporphyrin I aus normalem menschlichem Urin.

Auf die grundlegende Bedeutung der noch ungelösten Frage, ob das ätherlösliche Porphyrin des normalen Urins Koproporphyrin I (K I) ist oder das dem normalen Blut-

Fig. 1. Koproporphyrin I-Ester aus normalem Urin.

farbstoff nahestehende Koproporphyrin III (K III), wurde in letzter Zeit immer wieder hingewiesen, am deutlichsten wohl, außer durch H. FISCHER¹, durch H. KÄMMERER², der dieses Problem als einen Angelpunkt für die Deutung der Erscheinungen in der Biologie der Porphyrine betrachtet. Es ist uns nun als Ergebnis unserer langjährigen Arbeiten über die physikalische Chemie und Biologie der Porphyrine³ die Isolierung von kristallisiertem K I aus größeren Mengen menschlichen Urins mittels eines neuartigen Adsorptionsverfahrens gelungen⁴. Die Identifizierung konnte nun durchgeführt werden durch unsere an 34 verschiedenen Porphyrinen erprobte Methode der p_H -Fluoreszenzkurven⁵ mit

Hilfe des Zeisschen Stufenphotometers mit L_1 -Filter in Kombination mit der Analysenquarzlampe, welche experimentelle Anordnung zuerst von uns 1929 zur Messung der Porphyrin-fluoreszenz verwendet worden ist und später von FIKENT-

Fig. 2. Identitätsbeweis durch p_H -Fluoreszenzkurven.

ren Mengen menschlichen Urins mittels eines neuartigen Adsorptionsverfahrens gelungen⁴. Die Identifizierung konnte nun durchgeführt werden durch unsere an 34 verschiedenen Porphyrinen erprobte Methode der p_H -Fluoreszenzkurven⁵ mit

¹ Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 45, 21 (1933).

² Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 45, 30 (1933).

³ Biochem. Z. 211, 65 (1929) — Naturwiss. 17, 388 (1928) — Hoppe-Seylers Z. 197, 193 (1931).

⁴ Die Photographie der Kristalle wurde gezeigt anlässlich eines Vortrages in Stuttgart, Tagung d. Südwestdtsch. Chem. Dozenten, April 1933; s. auch Abb. in Diss. W. HOERBURGER. Erlangen 1933.

⁵ Naturwiss. 18, 16 (1929) — ferner K. WEBER, Inaug.-Diss. T. H. München 1930 — Hoppe-Seylers Z. 202, 8 (1931); 218, 181 (1933); 220, 133 (1933).

SCHER¹ und SAUER zur quantitativen klinischen Porphyrinbestimmung. Die Kurve des kristallisierten Koproporphyrins aus Urin ist identisch mit der des K I und unterscheidet sich deutlich von der des K III. Es wurden selbstverständlich gleiche, aber diesmal wesentlich geringere Porphyrinmengen verwendet, was schon seinerzeit bei der Beschreibung unserer Methode vorgesehen worden ist. Auf die Frage, ob und wann im normalen Harn noch weitere Porphyrine enthalten sind, werden wir demnächst eingehen.

München, Wissenschaftliche Station für Brauerei und Technische Hochschule, den 7. April 1934.

HERMANN FINK und WOLFGANG HOERBURGER.

¹ Biochem. Z. 249, 257 (1932).

Berichtigung.

In der kurzen Originalmitteilung „Eine Synthese des Vitamins C“ von MICHEEL und KRAFT in Heft 13 dieser Zeitschrift, Seite 205/206, ist durch einen Irrtum des Setzers stets statt *l*-Sorbitose — und bei allen anderen Stoffen der *l*-Reihe — *e*-Sorbitose usw. gesetzt worden.