Berichtigung

zur Arbeit

Bestimmung des Mizellgewichts von Assoziationskolloiden in der Ultrazentrifuge

Zur Molekülassociation einiger Oberflächen-Anaesthetica

Von R. Jaenicke (Frankfurt a. M.)

Kolloid-Z. u. Z. Polymere **212**, 36-45 (1966)

Durch ein Versehen sind die Abbildungen zum Teil nicht richtig wiedergegeben.

Abb. 1. Sedimentations-Photogramme von Cinchocain (I), Tetracain (II), Stadacain und Homologen (III-V) [0,9% NaCl]_{aq}, 20 °C.

I-V: Überschichtungs-Versuche (c-Verfahren): $\varphi = 80^\circ$. I: 4 über 5%, $t = 20'$, 59780 U/min; II: 5 über 6%, $t = 18'$, 59780 U/min; III: 3 über 4%, $t = 16'$, 59780 U/min; IV: 2,5 über 3,5%, $t = 18'$, 59780 U/min; V: 0,3 über 2%, $t = 48'$, 29500 U/min. I_A: Archibald-Versuch: 5%, $t = 40'$, 25980 U/min, $\varphi = 87,5^\circ$; III_A: Archibald-Versuch: 5%, $t = 22'$, 25980 U/min, $\varphi = 80,0^\circ$; III_B: normales Überschichtungs-Verfahren 0% über 1%, $t = 18'$, 59780 U/min $\varphi = 80^\circ$

Die Klischees der Abb. 2 und 3 wurden vertauscht.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Für Originalarbeiten Prof. Dr. F. H. Müller, 3550 Marbach b. Marburg/Lahn und für Referate und Berichte Dr. E. Uhlein, 6000 Frankfurt/M.

Anzeigenverwaltung: Dr. Karl Niedermeyer, 6000 Frankfurt/M.-West, Georg-Speyer-Straße 76

Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 6100 Darmstadt, Saalbaustraße 12

Satz und Druck: Universitätsdruckerei Mainz GmbH