qu'une seule conclusion à tirer de cela: l'absence de réactivité chimique, ainsi que nous l'avons déjà dit en 1921 à propos du livre de Loeb; impossibilité d'expliquer le pouvoir-tampon par des réactions d'affinité chimique, mais, plus simplement, plus physiquement, par les phénomènes d'adsorption. Piettre se range, du reste, à cette solution, mais il ne le dit pas très clairement, de sorte que sa conclusion — l'absence du pouvoir-tampon envers les ions H^+ , heurte les faits établis. Par contre, on ne comprend plus lorsqu'un chimiste parle d'une « particule sérique », et se rapproche ici de l'opinion d'un biologiste selon lequel tout dans un liquide organique complexe tel que le sérum s'intégrerait pour former une « molécule homogène sérique ». Si un jour on présenterait un mélange de divers sels neutres un chimiste oserait-il le considérer comme une « molécule saline » au lieu de le soumettre à une analyse qualitative et quantitative?

Dans ces conclusions nous voyons chez Piettre l'effet d'une déformation physique chez un chimiste. Il faut croire que Horace ment: à notre époque « aurea mediocritas » n'est pas une situation de tout repos....

C'est que, à notre époque, il y a aussi peu de livres que l'on arrive à lire jusqu'au bout.... et qu'il y a peu de chercheurs qui osent heurter les opinions enracinées.

W. KOPACZEWSKI.

Dognon, A., E. et H. Bianciani, *Ultra-sons et Biologie*. Paris, Gauthier-Villars, 1937. 80 S., 22 Fig. fr. 25,—.

Die von Dognon und Bianciani herausgegebene „Collection des Actualités Radiobiologiques“ beginnt mit dem vorliegenden Hefte, das in höchst anregender Weise die für die Biologie bedeutsame Wirkung der Ultraschallwellen auf lebende Organismen zum erstenmal mit allen physikalischen Grundlagen recht erschöpfend behandelt. Es ist sehr erfreulich, daß auf diesem ganz neuen Gebiete die Forschung sogleich das Problem an der Basis alles biologischen Geschehens angreift: Es liegen nämlich schon zahlreiche Untersuchungen vor über den Effekt der Ultraschallwellen auf das Protoplasma selbst. Dabei ergaben sich Tatsachen, die zunächst zwar nicht leicht verstanden werden können, die man aber mit den Autoren wirklich als „extrêmement curieux“ bezeichnen muß. Die wissenschaftliche Neugierde war und ist aber immer der Anstoß zu neuer Erkenntnis und Einsicht. Dem Protoplasmaforscher kann somit die Lektüre dieser „Actualités“ sehr empfohlen werden, denn die mühevoll zusammengetragenen Befunde, die er mühelos in diesem Hefte findet, werden wohl bald wirklich aktuell sein.

F. Weber (Graz).

Berichtigung

M. Moldenhauer Brooks macht uns darauf aufmerksam, daß es in dem Referat über ihre Arbeit „The effect of Methylene Blue on HCN and CO poisoning“, diese Zeitschrift 27, 139, Zeile 5—8 statt „36 % der Tiere bei Blausäure- und 57 % bei Kohlensäurevergiftung konnte so ...gerettet werden“, heißen soll „Die zur Erholung notwendige Zeit konnte durch 1 cem einer 0,01 m Methylenblaulösung in Ringer-Glukose (für 100 g Tier) bei Blausäurevergiftung auf 36 % und bei Kohlenoxydvergiftung auf 57 % derjenigen der Kontrollen verkürzt werden“.

Die Redaktion.