Nach etwa 10—20 Minuten ist bei Anwendung eines Stromes von 4—5 Ampère die Abscheidung des Kupfers als sicher beendet anzunehmen. Ohne Stromunterbrechung wird die Elektrode abgewaschen. Mit einem kräftigen Wasserstrahl der Spritzflasche werden die letzten anhaftenden Gewebefasern der Konserve abgespritzt. Das Kupfer wird mit 10 ccm Salpetersäure (1,4) nochmals abgelöst, die Elektrode gut abgespült, ausgeglüht und gewogen. Die Kupferlösung wird wieder schwach ammoniakalisch gemacht, dann werden 10 ccm Schwefelsäure (1:1) zugesetzt und mit Wasser auf 150 ccm gebracht. Die auf 80—90° erwärmte Lösung wird wieder mit einem Strom von 4—5 Ampère unter gleichen Bedingungen wie oben elektrolysiert. Nach dem Auswaschen und Abspülen wird die Elektrode noch mit dem Kupferbelag durch Alkohol und Äther gezogen getrocknet und gewogen. Die Übereinstimmung mit den Bestimmungen nach der Aschenmethode ist gut, wie aus einigen Beispielen aus der Praxis ersichtlich ist; es wurden in 100 g an Kupfer gefunden:

	Nach der Aschenmethode	Durch direkte elektrolytische Bestimmung
Spinat	54,3 mg	54,0 mg
Erbsen	48,2 „	48,0 „
Schnittbohnen	75,8 „	76,0 „

Wo die nötige Apparatur für eine Elektrolyse vorhanden ist und derartige Untersuchungen durchgeführt werden, kann dieser Weg nur bestens empfohlen werden, um so mehr, als eine derartige Bestimmung nicht mehr als 2 Stunden in Anspruch nimmt.

Berichtigung.

In unserer Arbeit: „Vorkommen, Nachweis und Bestimmung von Laurinsäure in alkoholischen Getränken“ (Diese Zeitschrift 1928, **56**, 167—187) muß es in der letzten Spalte der Tabelle auf S. 184 heißen: „Caprylsäure in 100 ccm absolutem Alkohol“ statt „Caprylsäure in einem Liter absolutem Alkohol“.

Dr. J. Großfeld und Dr. A. Miermeister.

Referate.

Mikroskopische und bakteriologische Untersuchungsmethoden.

J. A. Imhoff: Die Schimmelprobe und ihre Bedeutung für die Beurteilung von Nahrungsmitteln. (Chem. Weekbl. 1926, **23**, 293—296.) — In den amtlichen Untersuchungsmethoden für Mehl, Kakao und Gewürze wird folgende Methode angegeben für die Ausführung der Schimmelprobe: 1,5—2 g der zu untersuchenden Substanz werden in einer sterilen Petri-Schale von etwa 10 cm Durchmesser mit etwa 3 ccm sterilem Wasser angerührt und gleichmäßig über den Boden der Schale verteilt. Die Schale wird im Brutschrank bei 35—37° aufbewahrt und der Schimmelwachstum nach 24 Stunden beurteilt. Bei Gewürzen wird der Versuch in einem Erlenmeyer-Kölbchen vorgenommen, in welchem 10 g steriles Wasser mit 5 g der zu untersuchenden Substanz gemischt werden, oder mit soviel mehr, daß alles Wasser aufgenommen wird. Der Kolben wird 3×24 Stunden im Brutschrank bei 35° aufbewahrt. Nach dieser Zeit darf die Ware weder schimmelig noch in anderer Weise deutlich verdorben oder zersetzt sein. — Verf. bemerkt, daß das Ergebnis dieser Probe sehr stark von der Ausführungsweise beeinflusst wird. Die Menge des Wassers, die Mischung der Substanz mit dem Wasser, die Temperatur und