Die Geschwulstanpassung an die Röntgenstrahlen muß sich nicht unbedingt morphologisch äußern, außerdem kennen wir eine Reihe von sehr wenig differenzierten Geschwülsten, die jedoch gegen die Röntgenstrahlen höchst widerstandsfähig sind, so z. B. manche Geschwülste von embryonalem Typus, wie z. B. die radioresistenten Embryocytome (*Nemenow*) und Scirrhen.

Auf diese Weise kann man nicht immer die gesteigerte Resistenz der Rezidive durch ihre Differenzierungssteigerung erklären. Diese beiden Erscheinungen verlaufen nicht parallel und diese Frage bedarf noch weiterer Untersuchungen.

Literaturverzeichnis.

- ¹ *Aschoff, Krönig u. Gauss*, Münch. med. Wschr. **1913**, Nr 7—8. — ² *Baisch*, Strahlenther. **10** (1920). — ³ *Belot*, Index analyticus cancerologiae. Ref. 1928. — ⁴ *Beau*, Index analyticus cancerologiae. Ref. 1927. — ⁵ *Böhm u. Zweifel*, Gynäk. **1926**. — ⁶ *Borst*, Die Lehre von den Geschwülsten. Wiesbaden 1912. — ⁷ *Borst*, Allgemeine Pathologie der malignen Geschwülste. Leipzig 1924. — ⁸ *Döderlein*, Mschr. Geburtsh. **90** (1932). — ⁹ *Delporte et Cahen*, Index analyticus cancerologiae 1930. — ¹⁰ *Eymer*, In Halban u. Seitz, Handbuch der Biologie und Pathologie des Weibes **4** (1918). — ¹¹ *Fedorejew*, Vopr. Onkol. (russ.) **4** (1931). — ¹² *Franqué*, Strahlenther. **21** (1926). — ¹³ *Gambaroff*, Strahlenther. **41** (1931). — ¹⁴ *Hamperl u. Schwarz*, Strahlenther. **24** (1927). — ¹⁵ *Hansemann*, Berl. klin. Wschr. **1914**, Nr 29. — ¹⁶ *Hüssy*, Strahlenther. **10** (1920). — ¹⁷ *Körbl*, Arch. klin. Chir. **97** (1912). — ¹⁸ *Kehrer u. Lahm*, Strahlenther. **10** (1920). — ¹⁹ *Laborde*, Index analyticus cancerologiae. Ref. 1931. — ²⁰ *Lacassagne*, Ref. Zbl. Radiol. **10**. — ²¹ *Lahm*, In Halban u. Seitz, Handbuch der Biologie und Pathologie des Weibes **4** (1928). — ²² *Lavoipierre*, Index analyticus cancerologiae. Ref. 1927. — ²³ *Lubarsch u. Watjen*, In Lazarus, Handbuch der gesamten Strahlenkunde. — ²⁴ *Nemenow*, Allgemeine Röntgenologie. Leningrad 1933 (russisch) — *Vestn. Rentgenol.* **3** (1924); **12** (1932). — ²⁵ *Opits*, Strahlenther. **21** (1926). — ²⁶ *Prym*, Strahlenther. **21** (1926). — ²⁷ *Roussy et Laborde*, Index analyticus cancerologiae. Ref. 1927. — ²⁸ *Scholten u. Volts*, Münch. med. Wschr. **1925**. — ²⁹ *Schulte*, Arch. Gynäk. **121** (1924). — ³⁰ *Seulberger, Schmidt u. Krönig*, Strahlenther. **31** (1929). — ³¹ *Stern u. Bott*, Strahlenther. **21** (1926). — ³² *Thibaudau u. Burke*, Ref. Zbl. Radiol. **8**. — ³³ *Wetterer*, Strahlenther. **10** (1920).

Berichtigung.

Zur Arbeit von *Schabad* „Über die cancerogene Wirkung des 1:2:5:6 Dibenzanthracens. (Experimentelles Sarkom bei Mäusen)“ in Bd. 42, H. 4, S. 295. Der von mir angewandte Dibenzanthracen, den ich von Prof. Dr. H. T. Deelman erhalten habe, wurde, laut einer freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Deelman nicht im Laboratorium von Prof. Cook, London, synthetisiert, sondern von Prof. Backer, Groningen (Holland), hergestellt.

L. M. Schabad.