Berichtigung

von Prof. Schiess in Basel.

In einer Arbeit von Herrn Dr. Steffan in diesem Archiv Jahrgang 29, Abth. II, pag. 172 wird mir die Behauptung in den Mund gelegt, dass die Kernhaltigkeit der Staare erst mit dem 50. Altersjahre beginne. Ich muss mich hiegegen durchaus verwahren und kann ich den alten, durch von Graefe schon vor 28 Jahren im ersten Bande dieses Archivs ausgesprochenen Satz, dass jenseits 35 Jahren beinahe immer ein Kern vorhanden, aus langjähriger Erfahrung nur bestätigen.

Wie Herr Dr. Steffan zu seiner Auffassung meiner Meinung gekommen ist, ist mir unerklärlich. Unter der Rubrik: Messungen der Kerngrösse steht in meiner von Dr. Steffan citirten Arbeit oben an: „In 121 Fällen von reiner Alterscataract habe ich genaue Messungen angestellt über Breite und Dicke des Kerns. Die Kranken waren alle über 50 Jahre alt.“

Der Sinn ist wohl deutlich. Die Frage, ob vor 50 Jahren Kerne vorkommen oder nicht, ist ja gar nicht berührt. Die 50 Jahre sind einfach angeführt, um die Bezeichnung Alterscataract zu rechtfertigen. Hätte ich Messungen unter 50 Jahren angestellt, so würde man mir mit Recht vorgeworfen haben, dass das für einfache Alterscataracte keine Gültigkeit habe.