G. Hoheisel, Gewöhnliche Differentialgleichungen. Dritte Aufl. Sammlung Götschen 920. Berlin: W. de Gruyter, 1938. 126 S. Preis geb. RM 1,62.

Gegenüber der zweiten Auflage (1930) ist die Einteilung und Stoffauswahl ziemlich unverändert geblieben, die Darstellung ist dem etwas verringerten Umfang entsprechend vielfach knapper und zusammenfassender; ausführlicher werden die linearen Systeme von Differentialgleichungen behandelt. Die meisten Änderungen erfuhr das Kapitel „Randwertaufgaben“; die Greensche Funktion wird gleich im Anschluß an eine systematische Einführung der Randwertaufgaben gebracht. Die Darstellung der Entwicklungssätze wurde wesentlich vereinfacht. Das Büchlein wird auch in der neuen Fassung seine Beliebtheit bewahren. *H. Hornich.*

E. Kähler, Einführung in die Theorie der Systeme von Differentialgleichungen. Hamburger mathematische Einzelschriften 16. Leipzig: B. G. Teubner, 1934. IV, 80 S. Preis geh. RM 4,—, geb. RM 5,—.

Es wird eine Einführung in die Theorie der Systeme von Differentialgleichungen gegeben, und zwar werden an Stelle der von Cartan behandelten Pfaffischen Systeme gleich Systeme von Gleichungen betrachtet, die durch Nullsetzen von alternierenden Differentialformen beliebigen Grades entstehen. Die Darstellung gipfelt in zwei Existenzsätzen für Integralmannigfaltigkeiten, als Anwendungen werden u. a. die Hauptsätze der Lieschen Gruppentheorie gebracht. *H. Hornich.*

W. Blaschke-G. Bol, Geometrie der Gewebe. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, XLIX. Berlin: J. Springer, 1938. VIII, 339 S. Preis RM 28,50, geb. RM 29,70.

Das Werk bringt eine zusammenfassende Darstellung der Theorie der Gewebe. Im ersten Abschnitt werden alle Sätze behandelt, welche sich ohne Differenzierbarkeitsannahmen beweisen lassen. Nach einem einleitenden Paragraphen über Kurvenscharen und Kurvennetze werden die Sechseckgewebe betrachtet und gezeigt, daß sich ein Kurvengewebe nur dann auf ein regelmäßiges topologisch abbilden läßt, wenn sämtliche Brianchonsche Sechsecke sich schließen. Dies wird noch ergänzt durch den Satz von Graf und Sauer, daß die geradlinigen Sechseckgewebe die Tangentengewebe der ebenen Kurven 3. Klasse sind. Es folgt eine Darstellung der Beziehungen der Gewebe zu den Gruppen und eine Axiomatik der Gewebe. Darauf werden die Achtflach- und Vierseitgewebe besprochen. Wir heben nur den Satz hervor, daß jedes ebenflächige Achtflachgewebe aus gemeinsamen Tangentenebenen zweier quadratischer Flächen besteht. Nach Behandlung einer Funktionalgleichung und der zweigliedrigen Gruppen mit eingliedriger Untergruppe gipfelt der Abschnitt in dem Satze von Mayrhofer und Reidemeister: Wenn in einem 4-Gewebe jedes Sechseck sich schließt, so läßt sich das Gewebe auf vier Geradenbüschel abbilden. Dies wird noch ergänzt durch den Satz von Mayrhofer, daß projektiv verschiedene Geradenbüschel-4-Gewebe auch topologisch verschieden sind. Es werden nun die Klammerausdrücke eingeführt. Es folgt nun die Verallgemeinerung des Satzes von Mayrhofer und Reidemeister auf ebene n -Gewebe, wobei das 5-Gewebe eine Ausnahmstellung einnimmt. Der Abschnitt schließt mit den Vierseitgeweben. Der 2. Abschnitt bringt die Invariantentheorie der Gewebe, und zwar werden die vollständigen Invariantensysteme für ebene 3-Gewebe, Geraden Gewebe, Flächengewebe und Kurven-3-Gewebe im Raum aufgestellt. Der 3. Abschnitt führt nun das Abelsche Theorem ein. Es handelt sich in Verallgemeinerung des Satzes von Graf und Sauer um den Beweis folgender Behauptung: Wenn die Tangenten einer algebraischen Kurve der Klasse n ein n -Gewebe bilden, so gibt es Abelsche Parameter $t_i(x, y)$ $i=1, 2, \dots, n$, so daß die Abelsche Gleichung

$$\sum_{i=1}^n t_i(x, y) = \text{konst.}$$
 besteht. Der Satz und seine Umkehrung wird dann auf Ebenen-

gewebe übertragen. Es wird nun der Höchststrang bestimmt. Unter dem Rang eines Gewebes versteht man die Anzahl der linear unabhängigen Abelschen Gleichungen, die zu ihm gehören. Der Höchststrang wird nun für die ebenen n -Gewebe und Flächen- n -Gewebe bestimmt. Für $n \geq 6$ lassen sich die letzteren als topologisches Bild von Ebenengeweben charakterisieren. Der Beweis wird ausführlich für $n=8$ dargestellt. Dabei tritt auch eine Weylsche Geometrie auf. Diese Untersuchungen