Collins, G. N. Gametic coupling as a cause of correlations. The American Naturalist 46, S. 569.

Verfasser kritisiert die gewöhnliche Annahme, daß die abweichende Faktorengruppierung bei Abstoßungs- und Koppelungsbildungen nur nach der von Bateson aufgestellten Reihe

3 : 1 : 1 : 3
7 : 1 : 1 : 7
15 : 1 : 1 : 15
31 : 1 : 1 : 31
63 : 1 : 1 : 63
usw.

vorgehen kann. Das bis jetzt vorliegende Material wird kritisch untersucht, und mit Hilfe der Yuleschen „Coefficient of association“ wird gezeigt, daß die gefundene Übereinstimmung mit diesen Zahlen von keiner entscheidenden Bedeutung ist. Schon ist ja von Baur Koppelung nach dem Schema 6 : 1 : 1 : 6 gefunden, was sich in der obigen Reihe nicht einfügen läßt. In der Tat können mehrere Kreuzungsversuche, die in der Batesonschen Reihe eingefügt worden sind, ebenso gut auf anderen dazwischenliegenden Zahlenverhältnissen beruhen. — Versuche des Verfassers mit Mais zeigen, daß Korrelationen zwischen Faktoren in einigen Fällen nach der Bildung der Gameten bestimmt werden.

Hagem (Bergen-Norwegen).

Neilson, J. Species hybrids of *Digitalis*. Journal of Genetics 2, S. 71.

Verfasser hat Kreuzungen ausgeführt zwischen *Digitalis purpurea* und *D. grandiflora* und die F₁-Generation eingehend untersucht. Die beiden reziproken Kreuzungen sind gut gelungen. Die Hybriden sind in der Hauptsache intermediär, jedoch in mehreren Eigenschaften mit Annäherung an der betreffenden Mutterpflanze. Charaktere, die intermediär zur Ausbildung kommen, sind z. B. Größe der Pflanzen, Form der Blüten und Form der Laubblätter, Größe der Epidermiszellen u. a. Eigenschaften, die nur bei dem einen Elter vorhanden sind, kommen bei den Hybriden in abgeschwächtem Grade vor. Dies ist z. B. mit den stark roten Zeichnungen an den Blüten und mit den roten Flecken der Antheren der Fall. Nur wenige Charaktere sind rein dominierend. Es sind dies besonders die Dicke der Laubblätter und das Vorkommen der roten Flecken an den Antheren.

Hagem (Bergen-Norwegen).

Heribert-Nilsson, N. Ärttighetsförsök med blomfärgen hos *Anagallis arvensis*. Botaniska Notiser 1912. S. 220.

Verfasser hat von *A. arvensis* eine abweichende Form mit hell rosaroten Blüten untersucht. Die betreffende Form trat in 1909 in wenigen (ca. 20) Individuen in einem Rübenfelde in Schonen auf. Bei Selbstbestäubung gaben die Pflanzen konstant rosablühende Nachkommen. Kreuzung mit der gewöhnlichen mennigrotblühenden Hauptform gab in F₁ nur mennigrote Blüten, in F₂ dagegen Spaltung in 178 rote und 65 rosa Individuen, was mit der Annahme einer monohybriden Spaltung gut übereinstimmt. Von den roten F₂-Pflanzen gaben einige konstant rote Nachkommen, andere dagegen wieder Spaltung in rote und rosa.

Die Entstehung der neuen Form ist entweder als spontane Verlustmutation zu erklären, oder sie rührt von Neukombination verschiedener Faktoren für Blütenfarbe bei einer zufälligen Kreuzung genetisch verschiedener Individuen.

Hagem (Bergen-Norwegen).