Whitney, David D. Reinvigoration produced by cross fertilization in *Hydatina senta*. Journ Exp. Zool. 12 1912.

Der Verfasser untersuchte bei *Hydatina senta*, einem Rädertier, den Einfluß der Inzucht und der Auffrischung von durch Inzucht geschwächten reinen Linien durch Kreuzung verschiedener Linien. *Hydatina* pflanzt sich geschlechtlich oder parthenogenetisch fort. Es läßt sich infolgedessen vergleichen: 1. Inzucht mittels Parthenogenese innerhalb einer reinen Linie, 2. Wirkung geschlechtlicher Fortpflanzung innerhalb der parthenogenetisch gezüchteten Linie, 3. Wirkung der Kreuzung zweier solcher Linien. Dabei zeigte sich, „that a great amount of rejuvenescence occurs, when two weak races are crossbred and that only a small amount of rejuvenescence takes place when each weak race is inbred with itself“.

Parthenogenetische Inzucht führte in einem Fall (Rasse B) in der 384. Generation zum Tod, während eine Schwesterlinie noch in der 503. Generation bestand, „but is in a very exhausted condition“. Als Kriterium für den Grad der Erschöpfung diente das Maß der parthenogenetischen Vermehrung. In jener Rasse B lieferte zuletzt nur noch ein einziges unter 60 isolierten Weibchen wenige — nämlich zwei — Nachkommen. Von den übrigen 59 ♀♀ starben 39 vor der Geschlechtsreife ab, 20 besaßen normale Lebensdauer und bildeten Eier in den Ovarien, legten sie jedoch nicht ab.

Dagegen waren bei einer andern, erst wenige Generationen unter Inzucht entwickelte Rasse (D) unter 60 isolierten ♀♀ 59 vermehrungsfähig mit mittlerer Nachkommenzahl von 13,2 pro Weibchen und nur ein vor der Reife absterbendes ♀. Die Genauigkeit der Resultate scheint dem Ref. allerdings beeinträchtigt durch manche der Ursache nach offenbar unerklärte Schwankungen. So waren die mittleren Nachkommenzahlen in 4 aufeinanderfolgenden Generationen (303.—306.) der gleichen Linie: 3,5; 6,4; 9,6; 8,0. Die Schwankungen bei andern Linien gingen in der gleichen Zeitspanne kaum parallel. Die Erschöpfung der Rasse wird kaum vermindert, wenn geschlechtliche Vermehrung innerhalb der Rasse einsetzt. Anders aber, wenn zur geschlechtlichen Vermischung Tiere zweier verschiedener, geschwächter Rassen verwendet werden. Die auf diese Weise durch Kreuzung erzielten Individuen — ♀ — liefern Nachkommen wiederum auf parthenogenetischem Wege, deren Zahl so hoch ist wie bei einer Rasse, wo Inzucht eben erst begonnen hat. Beispiel: Rasse A brachte nach mehrmaliger geschlechtlicher Fortpflanzung, wobei jedoch nur Individuen des eigenen Rassenbestandes gepaart wurden, also Inzucht getrieben worden war, 4,1 Nachkommen (parthenogenetisch) pro Muttertier hervor, Rasse B sogar nur 3,1. Bei Kreuzung der Rasse A und B aber stieg diese Zahl auf 7,3, zahlreichere Nachkommen lieferte auch keine noch nicht durch Inzucht erschöpfte Rasse in einem Falle 7,23 Nachkommen pro Muttertier.

(Es muß auch hier beigelegt werden, daß der Effekt der Kreuzung nicht immer so deutlich, sondern großen Schwankungen unterworfen ist. Die mittlere Nachkommenzahl variierte bei einer Versuchsreihe zwischen 1 und 10, bei den Inzuchtkontrollen zwischen 0 und 7. D. Ref.)

Baltzer.

Schindler, B. Über den Farbenwechsel der Oscillarien. Zeitschr. f. Botanik 5 1913 S. 497—585.

In seiner Einführung in die experimentelle Vererbungslehre 1911 sprach Baur die Forderung aus, die Versuche Gaidukows über die komplementäre