für die Entwicklung der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale,
 2. die Frage, ob Arrhenoblastome testikuläres Inkret (Androkinin) bilden,
 3. die Beziehungen zwischen Arrhenoblastomen und Nebennierensystem.

Es wird die histologische und klinische Abgrenzung gegen Struma ovarii, Granulosablastom und Disgerminom besprochen.

Literaturverzeichnis.

Amati: Zbl. Gynäk. 1928, 2639. — *Berger*: Zit. nach *Kohn*. — *Bergstrand*: Klin. Wschr. 1934, 580. — *Berner*: Zbl. Path. 48 (1930). — *Bevern*: Zit. nach *Wagner*. — *Butenandt*: Dtsch. med. Wschr. 1934, 771. — *Büttner*: Virchows Arch. 287 (1932). — *Chevassu*: Zit. nach *R. Meyer*. — *Davis*: Zit. nach *Wagner*. — *Everland*: Nederl. Tijdschr. Verlosk. 36 (1933). — *Felix*: *Keibel-Malls* Handbuch der Entwicklungsgeschichte, Bd. 2. 1911. — *Fellner*: Klin. Wschr. 1932, 447. — *Fischel*: Entwicklung des Menschen, 1932. — *Freud*: Klin. Wschr. 1932, 776. — *Halban*: Zit. nach *Wagner*. — *Heesch*: Virchows Arch. 268 (1928). — *Hegar*: Beitr. Geburtsh. 4 (1901). — *Kleinhans*: Zit. nach *Wagner*. — *Kohn*: Endokrinol. 1 (1928). — *Küstner*: Münch. med. Wschr. 1933, 137. — *Loewe u. Voss*: Zit. nach *Siecke*. — *Mathias*: Zbl. Gynäk. 1933, 449. — *Meyer, Rob.*: Studien zur Pathologie der Entwicklung, herausgeg. von *Meyer-Schwalbe*, Bd. 2. 1920. — Klin. Wschr. 1930, 2237. — Zbl. Gynäk. 1930, 2374. — Z. Geburtsh. 98, 149 (1930). — Arch. Gynäk. 145 (1931). — Mschr. Geburtsh. 87 (1931). — *Neumann*: Arch. Gynäk. 122 (1924). — Zbl. Gynäk. 1925, 465. — Arch. Gynäk. 126 (1925). — Arch. Gynäk. 131 (1928). — Z. Geburtsh. 101 (1932). — *Orru*: Ref. Ber. Gynäk. 21, 103 (1932). — *Pick*: Arch. Gynäk. 76 (1905). — *Popoff*: Ref. Ber. Gynäk. 17, 609 (1930). — *Putschar*: Ref. Münch. med. Wschr. 1932, 369. — *Rössle-Wallart*: Beitr. path. anat. 84 (1930). — *Sedlacek*: Arch. Gynäk. 153, 276 (1933). — *Sellheim*: Z. mikrosk.-anat. Forsch. 3 (1925). — Arch. Frauenkde u. Konstit.forsch. 12 (1926). — *Siecke*: Arch. Gynäk. 146 (1931). — Arch. Gynäk. 156 (1934). — *Spielman*: Ref. Ber. Gynäk. 25, 48 (1933). — *Steinach*: Zit. nach *Stieve*. — *Stieve*: Med. Klin. 1932, 849. — *Straßmann*: Z. Geburtsh. 98, 131 (1930). — Z. Geburtsh. 99, 368 (1931). — *Stübler-Brandes*: Zit. nach *Wagner*. — *Taylor, Wolfermann u. Krock*: Ref. Ber. Gynäk. 25, 394 (1933). — *Wagner*: Z. Geburtsh. 98 (1930). — *Waldstein*: Zbl. Gynäk. 1929, 1305. — *Wallart*: Zit. Arch. nach Gynäk. 145, 58. — Arch. Gynäk. 138, 564 (1929).

Berichtigung.

In dem Beitrag *Schultz* „Die Pseudoanämie in der Schwangerschaft“ (ds. Arch., Bd. 157, 1, S. 110 f.) muß es in der Tabelle 14 auf Seite 135, bei 2. Essentielle Schwangerschaftsanämie, in der Rubrik Erythrocyten anstatt „unter 3,5 Mill.“ „unter 3,0 Mill.“ heißen.