Ich habe diese Versuche bereits 1923 angestellt, aber nicht veröffentlicht, weil die Methode der Druckmessung für die damals geplante Arbeit nicht geeignet war. Sie jetzt doch noch bekannt zu geben, veranlaßt mich eine Arbeit von *Kuraya* (*Acta scholae med.*, Kioto **6**, Heft 3, S. 373. 1924)¹⁾, der völlig unabhängig von mir mit fast genau der gleichen Technik Blutdruckmessungen am Ohr des Kaninchens anstellte und auch die gleichen Werte (mittlerer Blutdruck beim gesunden Tier 35—50 mm Hg) erhielt.

¹⁾ Zitiert nach dem Kongreßzentralblatt für die gesamte innere Medizin **41**, Heft 14, S. 751. 1926.

Berichtigung

zur Arbeit von *M. Okagawa*: „Das Verhalten der Milchsäure bei der künstlichen Durchströmung von Froschmuskeln“ in Heft 3/5 dieses Bandes, S. 577.

In der Tabelle 5, S. 585, muß es in Versuch 54, 1. Stunde, statt Ringer mit 1% Alkohol heißen: Ringer (also ohne Alkohol), und in Versuch 56 statt Ringer mit Kreatin 1%: Ringer mit Kreatin 0,1%.