Operation gesagt hatten; wir erhielten immer unsere Beobachtung bestätigt. Die Wachstumsverzögerung machte sich an den Haaren der ganzen Extremität bemerkbar. Je mehr dann die Haare nachwuchsen, desto weniger konnte der Unterschied im Wachstum festgestellt werden. Nach 5—6 Wochen war eine Differenz nicht mehr zu sehen.

Man muß also aus diesen Versuchen schließen, daß die periarterielle Histonektomie das Haarwachstum nicht beschleunigt, sondern im Gegenteil verlangsamt.

Die periarterielle Histonektomie kann nicht so wirken wie eine Sympathicusdurchschneidung. Nach dieser sieht man ein beschleunigtes Haarwachstum. Es ist ja auch von *Langley*¹⁾ und *Schilf*²⁾ gezeigt worden, daß es lange sympathische Bahnen in der Gefäßscheide nicht gibt. Auch von chirurgischer Seite³⁾ sind während der Ausführung von Operationen Versuche am Menschen gemacht worden, die diese physiologischen am Tier erhaltenen Befunde bestätigt haben. Ich glaube, daß meine mitgeteilten Versuche auch in diesem Sinne aufzufassen sind. *Die periarterielle Histonektomie wirkt nicht wie eine Sympathicusdurchschneidung auf das Haarwachstum.*

Herrn Privatdozenten Dr. E. Schilf, Assistenten am Institut, danke ich für seine freundliche Unterstützung bei der Ausführung der Arbeit.

¹⁾ J. Langley, a. a. O., S. 110.

²⁾ E. Schilf, a. a. O., S. 110.

³⁾ O. Wiedhopf, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der periarteriellen Sympathektomie und der Nervenvereisung auf die Gefäße der Extremitäten. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurg. **130**, H. 2, S. 399.

Berichtigung

zu der Arbeit

„Über den Einfluß der Ernährung auf die Wirkung des Insulins“,

Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. **203**, 439, 1924.

Von

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer.

(Physiologisches Institut der Universität Halle.)

Auf Seite 440 ist in der Fußnote ¹⁾ ein sinnstörender Druckfehler stehen geblieben. Es muß in der zweitletzten Zeile nach dem Komma heißen „bei *kohlehydratfrei* ernährten Tieren zeigt sich eine gleiche Abnahme des Gaswechsels erst bei viel höheren Dosen“.