IV. Kurze Nachrichten.

Bekämpfung der Maulwurfsgrille.

Von Oberforstmeister Höflich, Erlangen.

Die Maulwurfsgrille vernichtete heuer in einem Pflanzgarten der Forstamtsaußenstelle Kalschreuth des Forstamtes Erlangen-Ost die Saat nahezu vollständig.

Auf einen im Anzeiger für Schädlingskunde von Ettore Malenotti angegebenen, wirksamen und billigen Giftköder gegen diesen Schädling aufmerksam gemacht, habe ich das Mittel, Zinkphosphid, erprobt und möchte weiteren Kreisen davon Kenntnis geben.

Technisches Zinkphosphid, ein graues Pulver, ist zu beziehen von E. Mirc, Chemische Fabrik, Darmstadt. Es ist ein starkes, Phosphorwasserstoff enthaltendes Gift, das in trockenem Zustand nicht oder nur schwach nach Knoblauch riecht; dieser Geruch verstärkt sich außerordentlich, sobald das Pulver angefeuchtet wird. Die Dämpfe sind giftig.

Nach Mitteilung des Institutes für angewandte Zoologie der Bayer. Forstlichen Versuchsanstalt München ist der zu bereitende Köder zusammenzusetzen aus

100	Gewichtsteilen	Bruchreis,
25	,	Wasser und
5	"	Zinkphosphid.

Herstellung: Der Bruchreis wird zunächst mit Wasser angefeuchtet; sodann wird die nötige Menge Zinkphosphid hinzugemischt, bis der fertige Köder eine einheitliche, graue Farbe hat. Aufkochen des Köders ist zu vermeiden. Das fertig zubereitete Mittel muß am Abend des Herstellungstages ausgestreut werden. Es empfiehlt sich, das Ausstreuen des Köders nach 14 Tagen zu wiederholen.

An Ködermasse werden je Hektar gebraucht:

40 kg	Bruchreis à 0,50 RM.	20 RM.
10 kg	Wasser	
2 kg	Zinkphosphid einschl. Verpackung und Kollgeld	40 "
Herstellung der Mischung und zweimaliges Ausstreuen		5 "

Kosten je Hektar 65 RM.

Die Zubereitung des Köders soll im Freien erfolgen. Die nach Knoblauch riechenden Dämpfe dürfen nicht eingeatmet werden; der Arbeiter stellt sich bei der Herstellung des Mittels und beim Ausstreuen hinter den Wind. Auch darf der Köder nicht mit Händen mit offenen Wunden gestreut werden; man bedient sich deshalb beim Einmischen des Zinkphosphids in den angefeuchteten Bruchreis einer Spachtel, beim Ausstreuen des Köders eines Löffels. Hühner, Gänse und Ragen sind für 7—8 Tage von den vergifteten Feldern fernzuhalten.

Am wirksamsten wird das von der Maulwurfsgrille gerne angenommene Mittel sein, wenn es an regenfreien, warmen Abenden im Mai und anfangs Juni vor der Begattung und Eiablage der Elterntiere ausgestreut wird. Das Mittel wurde durch einmaliges Ausstreuen eines Köders, dem 125 g Zinkphosphid beigemischt waren, ausgeprobt. Vom 3. Tag ab nach Ausstreuen desselben wurden während 8 Tagen täglich 40—50 tote Maulwurfsgrillen gefunden. Die meisten toten Tiere steckten mit dem aufgetriebenen Hinterleib noch in den Gängen, Brustschild und Kopf ragten aus denselben heraus; einige tote Werren befanden sich auch völlig außerhalb der Gänge.

Neue Anschrift des A. T. f.

Die Geschäftsräume des Ausschusses für Technik in der Forstwirtschaft sind seit dem 1. Oktober 1930 in die Dessauer Str. 26, Berlin SW. 11 verlegt worden. Der Fernruf B I Kurfürst 6905 bleibt unverändert.