morierten und chlorophyllfreien Pflanzen zusammengesetzt. Grüne Aste gaben nur grüne Nachkommenschaft.

3. Aurea. Verf. glaubt, daß es sich hier um einen Fall von infektiöser Chlorose handelt, der aber in bezug auf Vererbung von den bisher bekannten vollkommen abweicht, da die Vererbung durch Ei- und Spermazellen stattfindet.

Verf. gibt eine genaue Beschreibung aller einzelnen aurea-Pflanzen. Er hofft über kurz oder lang, seine diesbezügliche Veröffentlichung zu ergänzen. Es erübrigt sich deswegen, hier schon jetzt näher darauf einzugehen.

Verf. berücksichtigt in seinen Angaben über die Chemie der Blattfarbstoffe nur die Arbeiten von Marchlewski. Richard Freudenberg.

Boyd, M.: Crossing Bison and Cattle. Jl. Heredity. Vol. V., 1914, p. 189 to 197 (6 fig.)

Goodnight, Ch.: My Experience with Bison Hybrids. Jl. Heredity. Vol. V., 1914, p. 197—99 (1 fig.)

Die in diesen beiden Aufsätzen geschilderten Kreuzungsversuche mit Hausrind und Bison, in praktischen Zuchtbetrieben in Canada und Texas ausgeführt, bezwecken die Schaffung eines für extensiven Weidebetrieb besonders geeigneten, gegen zeitweisen Futtermangel, Witterungseinflüsse und Krankheiten besonders widerstandsfähigen Tieres mit möglichst vorteilhafter Verteilung des Fleisches auf die verschiedenen Teile des Rumpfes. Das Produkt der späteren Kreuzungen, F_3 und folgende (= Cattalo = Kreuzungstier, dessen beide Eltern schon das Blut beider Rinderarten führen; da fruchtbare männliche F_1 -Bastarde nicht bekannt, erst in F_3 zu erzielen!), erscheint geeignet, diesen Anforderungen bei zweckmäßiger Weiterzucht einmal zu entsprechen.

An allgemein interessierenden Angaben entnehme ich den beiden Abhandlungen folgendes: Die aus der Kreuzung Bison ♂ × Hausrind ♀ („The reverse cross cannot be made“) entstandene F_1 ist sehr gleichförmig, größer als der Bison, als Fleischproduzent besser in Brust und Nachhand. F_1 ist jedoch schwer zu erzielen: Nach Boyd leiden die mit F_1 -Kälbern trächtigen Kühe ohne Ausnahme an Amnion-Wassersucht, zum Teil mit tödlichem Ausgange, die männlichen Kälber zeigen einen so stark entwickelten Höcker, daß eine Geburt meist nicht möglich; nach Goodnight verkalben diejenigen Kühe, die Bullkälber tragen, oder sterben vor der Geburt.

Die Rückkreuzungen dieser F_1 mit den beiden Stammarten ähneln in beiden Fällen stark dem bezüglichen reinrassigen Elter und zeigen ebenfalls große Gleichmäßigkeit.

Bei „Cattaloes“ (Kreuzungsprodukte von 2 Bastarden, die einen verschieden hohen Gehalt von Bisonblut führen können) hört die Gleichförmigkeit der gleichartig gezogenen Produkte auf, der prozentige Anteil der beiden Rassen an dem Bastard entscheidet nicht mehr, wie bisher, über die größere oder geringere Ähnlichkeit mit der einen oder anderen Stammart.

Die Angaben deuten darauf hin, daß das der Rinderrasse der „Herefords“ eigentümliche weiße Gesicht auch hier bei der Artkreuzung einfach spaltet. Sichere Angaben darüber fehlen leider.

Am wichtigsten sind zweifellos die Angaben über Geschlechtsverhältnis und Fruchtbarkeit der Bastarde der verschiedenen Abstufungen. Ich stelle sich nach den Angaben von Boyd in folgende Tabelle zusammen: