In den mit seinem *Lappa*-Bastard erhaltenen Resultaten sieht der Verfasser, und zweifelsohne mit Recht, eine Bestätigung von Batesons Ansicht, daß sämtliche Merkmale, auch Artmerkmale, mendeln (oder wenigstens mendeln können) und daß intermediäre konstante Bastarde, wenn überhaupt vorhanden, selten sind. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen führen auch Versuche, die Heribert Nilsson seit vier Jahren mit Arten von *Salix* ausgeführt hat, und über die er nächstens ausführlich berichten will.

Lidforss.

Nilsson, Heribert. Pollenslangarnes tillväxthastighet hos *Oenothera Lamarckiana* och *gigas*. (Die Wachstumsgeschwindigkeit der Pollenschläuche bei *Oenothera Lamarckiana* und *gigas*.) Botaniska Notiser 1911. S. 19—28.

In Anbetracht des großen Interesses, das sich noch immer an *Oenothera Lamarckiana* und ihre Mutanten knüpft, dürfte ein kurzer Bericht über das Hauptresultat der Nilssonschen Untersuchung angebracht sein. Durch zeitlich kontrollierte Bestäubung und nachheriges, in bestimmten Intervallen (an der Basis des Organs) erfolgendes Abschneiden der Griffel bestimmte Verfasser die Zeit, welche der Pollenschlauch für das Durchwachsen des Griffels nötig hat; denn nur falls dies stattgefunden, trat eine Weiterentwicklung der Samenknospen ein, eine partielle Apogamie, wie sie von Gates vermutungsweise angedeutet wurde, ließ sich in keinem Falle konstatieren. Es zeigte sich, daß die betreffende Zeit bei *Oenothera Lamarckiana* durchschnittlich 19, bei *O. gigas* dagegen 21 Stunden beträgt, im ersten Falle wächst der Schlauch 4,5 mm pro Stunde. Ob die konstatierte Verschiedenheit darauf beruht, daß die Pollenschläuche von *O. gigas* vielleicht langsamer wachsen oder darauf, daß die Narbe bei dieser Art länger ist (5—10 mm länger als bei *O. Lamarckiana*) wagt Verf. nicht zu entscheiden; die letztere Alternative scheint doch recht wahrscheinlich zu sein.

Lidforss.

Roemer, Theodor. Variabilitätsstudien. Dissertation. Jena 1910. Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie 7 1910. S. 397—469.

Aus dem vielseitigen, aber auch recht verschiedenartigen Inhalt der vorliegenden Abhandlung greift Referent nur die Punkte heraus, die für die Vererbungslehre ein allgemeineres Interesse haben.

Roemer strebt in seiner Arbeit einen Beitrag zur Lösung der Frage an, wie entstehen neue Biotypen innerhalb einer Population von Selbstbefruchtern, ein Problem, das durch Johannsens Untersuchungen über die Wirkungslosigkeit der Selektion in reinen Linien aufgerollt wurde. Allerdings handelt es sich um eine Reihe von Vorfragen, deren Entscheidung Autor versucht, doch dürfte diese Beschränkung dem heutigen Stand unserer Kenntnis angemessen erscheinen.

So vergleicht er die Variabilität verschiedener Eigenschaften innerhalb der gleichen Linie und weiterhin die Variabilität einer Eigenschaft in differenten Linien. Derartige subtile Untersuchungen stellen die höchsten Anforderungen sowohl an das Material wie an die mathematische Behandlung der gewonnenen Urzahlen. In dieser Beziehung scheint vor allem bedeutungsvoll die Wahl des Wertes zur Durchführung eines derartigen Vergleiches. Verf. bediente sich zu diesem Zwecke des Variationskoeffizienten ($v = 100\sigma : M$). Es drängt sich dabei die Frage auf, ist dieser in der Tat das geeignete