unterscheiden, bei den Eltern auftreten. Denn die Dementia praecox wird in den Geschwisterschaften nicht nur dann häufiger gefunden, wenn ein Elter an Dementia praecox erkrankt ist, sondern auch dann, wenn ein Elter an irgend einer andern Psychose leidet; Verf. berechnet für den letzteren Fall eine Häufigkeit von 8,21%. Demnach scheint das Vorhandensein anderer Psychosearten (besonders des manisch-depressiven Irreseins) bei den Eltern und Geschwistern Dementia praecox-Kranker nicht etwa eine nebensächliche Begleiterscheinung bei dem Auftreten der Dementia praecox zu sein, sondern mit dem Wesen dieser Krankheit in irgendeiner Weise innig zusammenzuhängen. Und da die bei den Eltern und Geschwistern gefundenen Psychosen zum Teil sehr verschieden sind, so liegt die Annahme nahe, daß die Geistesstörung des Elters und die Dementia praecox der zugehörigen Kinder Produkte komplizierter Spaltungsvorgänge sind, zu denen wir ja Analoga auf normal-morphologischem Gebiete im Tier- und Pflanzenreich die Menge haben (Farbeneffekte usw.).

Die Stiefgeschwister Dementia praecox-Kranker zeigen eine viel geringere Erkrankungshäufigkeit als die rechten Geschwister, nämlich nur 0,56%. Das spricht dafür, daß zum Zustandekommen der Dementia praecox ein Zusammentreffen krankhafter Erbanlagen von beiden Elternteilen erforderlich ist. Verf. glaubt deshalb, den Erbgang der Dementia praecox als „allgemein gesprochen“ rezessiv bezeichnen zu müssen; an anderer Stelle spricht er sogar von „latent oder rezessiv“. Eine solche Ausdehnung des Begriffes „rezessiv“, in den hier auch die Hypostase mit eingeschlossen erscheint, dürfte aber kaum zweckmäßig sein, da eine solche abweichende Begriffsbestimmung zu Mißverständnissen führen muß.

Die Stellung in der Geburtenreihe hat keinen deutlichen Einfluß auf die Häufigkeit der Dementia praecox. Die so oft behauptete stärkere Morbidität der Erstgeborenen erklärt sich durch eine fehlerhafte statistische Methode.

Das Geschlechtsverhältnis unter den Geschwistern der Dementia praecox-Kranken weicht nicht nennenswert von der Norm ab. Der Befund des Geschlechtsverhältnisses liefert also keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß irgendwelche allgemein degenerativen Momente bei den Eltern der Dementia praecox-Kranken wirksam sind.

Die häufig behauptete Anteposition (früherer Ausbruch der Krankheit bei den Kindern als bei den Eltern) zeigt auch das vorliegende Material. Der Hauptteil der Differenz rührt aber von dem einfachen, in der Literatur leider noch fast gar nicht berücksichtigten Umstande her, daß die in früherem Alter an Dementia praecox erkrankenden Individuen überhaupt nicht Eltern werden. So zeigt auch die vorliegende Arbeit, daß das sogenannte „Gesetz der Antizipation“, das viele phantastische Ansichten über „Degeneration“ genährt hat, zum größten Teil nichts weiter ist als ein statistisches Artefakt.

Siemens.

Pribram, Dr. Hugo. Über die Vererbung der diabetischen Konstitution. Zentralblatt für innere Medizin, 36. Jahrg., Nr. 21, 1915.

Verf. teilt in aller Kürze einen Stammbaum mit, in dem Diabetes gehäuft vorkommt. Erkrankt sind mehrere Kinder, die Mutter, deren Bruder und vielleicht auch der mütterliche Großvater; der Vater und der väterliche Großvater litten an Gicht. Der Diabetes trat im allgemeinen in den vierziger Jahren auf. Alle näheren Angaben über Art, Schwere und Verlauf der einzelnen Erkrankungen fehlen.

Siemens.