VIII.

Berichtigung.

Von

Dr. Körner.

In der Kritik meines Buches: „Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter“ (Archiv f. Ohrenheilk. Bd. XXXVI. S. 218) sagt Grunert:

„Die von Körner in Zweifel gestellte Thatsache des häufigeren Vorkommens der Multiplicität der Hirnabscesse bei Otitis wird durch die von Körner gebrachte Statistik selbst widerlegt. Während er S. 145 bei der Zusammenfassung der Statistik nur von einem Falle eines zweiten Abscesses spricht, hat er vorher auf S. 125, 133 und 135 selbst 3 Fälle von Complication eines zweiten Abscesses angeführt. Dies hat er offenbar bei der Zusammenstellung ganz übersehen.“

Indem Grunert von der durch mich in Zweifel gestellten Thatsache der Häufigkeit multipler otitischer Hirnabscesse spricht, bekennt er sich zu der Ansicht, dass solche nicht selten seien. Als man die otitischen Hirnabscesse noch nicht operirte, bot diese Frage nur ein theoretisches Interesse; jetzt aber hat sie eine grosse praktische Bedeutung gewonnen, denn die Annahme, dass in einem Falle mehrere Abscesse vorhanden sein könnten, wird natürlich die Operation als wenig aussichtsreich erscheinen lassen. Ich bin deshalb im Interesse der Sache gezwungen, das Grunert'sche Missverständniss klarzulegen, um so mehr, als Schwartz in seinem Handbuche der Ohrenheilkunde, Bd. II. S. 853. Anm. 1 sagt: „Die Multiplicität der Hirnabscesse ex otitide ist nach Lebert so häufig (unter 80 Fällen 22 mal), dass sie allerdings die Chancen der Operation erheblich verschlechtert.“ Grunert hat übersehen, dass ich auf S. 90 meines Buches gezeigt habe, dass unter den 80 Lebert'schen Abscessen nur 18 otitische waren, sonst würde er nicht aufs Neue diesen Streitpunkt aufgegriffen haben.

Die irrthümliche Interpretation der Lebert'schen Statistik durch Schwartz und die Kritik seines Assistenten Grunert sind um so unverständlicher, als gerade die Erfahrungen der Schwartz'schen Klinik die grosse Seltenheit multipler otitischer Hirnabscesse beweisen. Aus der Schwartz'schen Klinik sind in den 36 Bänden des Archivs für Ohrenheilkunde im Ganzen 20 Fälle von otitischen Hirnabscessen beschrieben worden, und diese waren alle solitär!

Grunert's oben angeführte Worte müssen die Vorstellung erwecken, als hätte ich die Seltenheit multipler otitischer Hirnabscesse mit der von ihm herausgegriffenen Statistik auf S. 145 meines Buches beweisen wollen. Dies ist jedoch an einer anderen Stelle (S. 89) auf Grund einer viel grösseren Statistik geschehen,

während die von Grunert erwähnte Statistik lediglich die Todesursachen bei den trotz operativer Entleerung des Abscesses Verstorbenen darstellt. Diese Statistik besagt, dass bei 26 nach der Entleerung des Abscesses Verstorbenen die Todesursache nur einmal in dem Vorhandensein eines zweiten Abscesses zu suchen war. Die zwei anderen, nach Grunert von mir übersehenen Fälle gehören gar nicht hierher. Was soll der geheilte Fall von Watson Cheyne (S. 133) in der Statistik der Todesursachen? Zudem ist es in diesem Falle nicht klar, ob der scheinbar zweite Abscess nicht lediglich eine Eiterretention in der Tiefe der Hirnwunde gewesen ist. Der andere durch Grunert bezeichnete Fall, der von Sahli (S. 125), wies allerdings bei der Section einen zweiten kleinen Abscess auf; dieser gehörte aber ebenfalls nicht in die Statistik der Todesursachen, da der Kranke an Meningitis gestorben war.

Es bleibt also bei der von mir bewiesenen Thatsache, dass multiple otitische Hirnabscesse sehr selten sind, und der Gedanke an die Möglichkeit eines so ungewöhnlichen Vorkommens darf heutzutage Niemand mehr von der Operation eines otitischen Hirnabscesses abhalten.¹⁾

1) Anmerkung der Redaction. Die in der vorstehenden Berichtigung des Herrn Dr. Körner gemachte Angabe, dass die in den ersten 36 Bänden (excl. Heft 4 von Bd. XXXVI) dieses Archivs aus der Ohrenklinik in Halle mitgetheilten Fälle von otitischen Hirnabscessen sämmtlich solitär gewesen sein sollen, beruht auf Irrthum. Ich bitte zu vergleichen Bd. XXVII, S. 214 Fall Laue; Bd. XXIX, S. 257 Fall Seiler; Bd. XXXIV, S. 269 Fall Strietzel. Um die streitige Frage jedoch auf der Basis eines grösseren Materials zu prüfen, habe ich sämmtliche Fälle von otitischen Hirnabscessen, welche überhaupt in den ersten 36 Bänden dieses Archivs (excl. Heft 4 von Bd. XXXVI) publicirt sind, zusammenstellen lassen, und dabei hat sich ergeben, dass unter 75 Fällen 15 mal mehrfache Abscesse gefunden wurden. Ausserdem hat ein Auszug aus den Sectionsprotokollen des pathologisch-anatomischen Instituts in Halle ergeben, dass unter 45 Fällen von Hirnabscessen, welche innerhalb 20 Jahren (1874—1894) aus sämmtlichen klinischen Instituten und aus anderen Krankenhäusern dort zur Section gekommen sind, 5 mal zweifellos und 2 mal unsicher mehrfache Abscesse vorhanden waren. Unter den 45 Fällen sind 23 otitische Hirnabscesse (20 aus der Ohrenklinik) und hierunter 2 Fälle von mehrfacher Abscessbildung.

Lebert (Virchow's Archiv) hat im Ganzen über 80 Gehirnabscesse berichtet. Von diesen waren 20 (nicht 18, wie Körner sagt) otitische, und zwar 6 nach acuten, die übrigen nach chronischen Eiterungen entstandene Hirnabscesse. Darunter 15 solitär und 5 multipel. Rechnen wir zusammen das Resultat aus Lebert's Publicationen und aus dem Archiv für Ohrenheilkunde, Bd. I—XXXVI (exclusive Heft 4 des letzteren), so ergibt sich, dass nahezu 20 Proc. aller otitischen Hirnabscesse multipel waren. Mein von Körner berichteter Irrthum bezüglich der von Lebert mitgetheilten Zahl otitischer Abscesse hat also für den Procentsatz der Multiplicität derselben keine Bedeutung gehabt.

Ob Angesichts dieser Thatsachen für Herrn Dr. Körner noch die Berechtigung vorliegt, die Multiplicität des Hirnabscesses bei Otitis für „sehr selten“ zu erklären, scheint mir doch zweifelhaft, wenn ich ihm auch vollständig darin zustimme, dass überwiegend häufig nur ein isolirter Abscess vorhanden ist. Für die Prognose wird aber doch mit der ungünstigen Chance, einen mehrfachen Abscess vor sich zu haben, immerhin zu rechnen bleiben.

Schwartz.