an Blase und Mastdarm total gelähmt war, keine wesentliche Besserung nach der Entfernung der 4,8 cm langen, 2 cm breiten und 1 cm dicken Geschwulst bisher eingetreten ist, konnte die andere 36 Jahre alte Frau, die ebenfalls im Tragkorb ins Krankenhaus gebracht wurde, gehend dasselbe nach der Exstirpation des 2 cm langen, 1 cm breiten und ebenso dicken Tumors verlassen. Sie kann heute, nach neuestem Bericht, als geheilt angesehen werden.

In beiden Fällen deckte eine nur etwa 1 mm dünne Schicht von Rückenmarksgewebe die Geschwulst. Die Auslösung aus dem Rückenmark konnte mit dem Hochfrequenzschnitt mit allerfeinster Nadel fast ohne Blutung vorgenommen werden. (Vorweisung der Präparate.)

O. B. Meyer (Würzburg) erwähnt einen Fall von intramedullärem Tumor deswegen, weil er wohl ein Unikum darstellt. Es handelte sich um eine stiftförmige, scharf abgegrenzte Carcinometastase von 3—4 mm Durchmesser, die sich über 8 Segmente bis zum 10. Dorsalsegment hinauf erstreckte. Bei der Operation (Prof. F. König) war der Tumor nicht gefunden worden (Dura nicht eröffnet), dagegen ergaben Autopsie und mikroskopische Präparate, daß er richtig lokalisiert war. Infolge seiner scharfen Begrenztheit wäre er nach den Erfolgen, über die soeben Herr Foerster vorgetragen hat, operabel gewesen, so daß es sich empfiehlt, auch wenn ein Tumor nicht palpabel ist, zwecks besserer Untersuchungsmöglichkeit die Dura zu eröffnen. Der Fall ist pathologisch-anatomisch von Kirch veröffentlicht worden.

Pette (Hamburg): Die große Zahl der mitgeteilten Tumoren stellt insofern etwas Besonderes dar, als die Fälle in einer Klinik klinisch und histologisch untersucht wurden. Das Material könnte in dreifacher Hinsicht weitere Aufschlüsse bringen: 1. zur Frage der Häufigkeit des Übergreifens des intramedullären Tumors auf die Meningen, 2. zur Frage der Bindegewebsentwicklung in Tumoren ektodermaler Genese und 3. zur Frage der Höhlenbildung in Nachbarschaft des intramedullären Glioms, um damit Stellung nehmen zu können zur Lehre Kirchs.

Kroll (Greifswald) fragt, wie die Erfahrungen der Vortragenden über die Wirksamkeit der Röntgenbestrahlung bei der verschiedenen spezifischen Art der besprochenen Tumoren sind. Es scheint ja, daß man durch möglichst frühe Röntgenbestrahlungen bald nach der Operation einen besonders schnellen Restitutionsverlauf z. B. bei Ependymomen erreicht. Die Dosen dabei müssen möglichst hoch gewählt werden.

Gagel (Breslau): Die starke Bindegewebsteilnahme beim letzten Tumor wird durch Störung des Schließungsmechanismus des Neuralrohres erklärt.

Berichtigung.

In meinem Vortrag „Indikation und Technik der Kontrastmethoden bei Hirnerkrankungen“ (siehe S. 191 dieses Bandes) habe ich die Einführung des Thorotrasts in die Arteriographie Jacobi und Löhr zugeschrieben. Wie ich inzwischen festgestellt habe, wurde von Moniz bereits 1931 eine Arbeit über Erfahrungen mit Thorotrast in der Arteriographie veröffentlicht.

Schaltenbrand.