höhle" ist die Hängelleiste durch einen Drahtbügel ersetzt. Als Bedachung wird ein Deckel aus Zinkblech verwendet, der durch die Ecken des Drahtbügels gehalten wird. Zur Vermeidung von Tropfwasserbildung am Deckel dient auf dem Bohrloch ein kreisrundes Stück Sperrholz, das um einen Nagel drehbar ist. Wie weit dieser Versuch im Laufe der Jahre ein günstigeres Ergebnis liefert, als die pendelnden Nistkästen von Forstmeister Dörr, muß die Zukunft lehren, auch diese blieben ja die ersten 4 Jahre verschont, was bisher auch bei den „Steinfrüher-Nisthöhlen“ festzustellen war.

Die Frage des vollständigen Schutzes der Nisthöhlen gegen Spechte ist demnach noch nicht restlos gelöst, für die Erweiterung des Flugloches hilft wohl der Blechring, bei sonstigen Schäden müssen wir uns einstmals damit behelfen, ein Schwartenbrett über die beschädigten Stellen zu nageln, dann wird die Nisthöhle fürs erste auch wieder gebrauchsfähig sein.

Dr. H. W. Frickhinger.

Zur Nützlichkeit des Waldfauzes.

Die Nützlichkeit der Raubvögel wird meist nicht nach ihrem wahren Werte eingeschätzt, nur genaue Untersuchungen des Gewölles können uns darüber Auskunft geben. Jede Beobachtung nach dieser Richtung ist deshalb auch für den Land- und Forstwirt, der in den Eulen natürliche Helfer im Kampfe gegen die Schädlingswelt erblicken muß, von Interesse. Helmut Schäfer-Görlich berichtet im „Naturforscher“ (9. Jahrgang 1932/33 Heft 4) von Gewölluntersuchungen, die recht belangreiche Ergebnisse zeigen. Schäfer fand in einem eichendurchsetzten Fichtenstangenholz am Jungferensee (Kreis Ohlau) Gewölle, die 162 Beutetiere erkennen ließen, und zwar 148 Wirbeltiere und 14 bestimmbare Insekten. Etwa 50% der Tierreste stammten von der Wühlmaus (in der Hauptsache zu *Arvicola arvalis* gehörig), die sich der Rauz aus einem nahen Weiher erjagt haben mag. Echte Mäuse (die sonst die Hauptnahrung des Waldfauzes bilden) fanden sich in diesem Gewölle kaum, desgleichen Spitzmäuse und große Nager, wie Fäse und Wasserratte, auch kaum eine Fledermaus, alles Tiere, die auf dem Speisezettel der Eulen stehen, und womit sie uns natürlich auch manches nützlichen Tieres berauben (Fledermaus, Spitzmaus usw.). Vögel waren zu nur 2% nachzuzahlen, es waren im wesentlichen Kleinvögel, vornehmlich finkenartige. 28% der tierischen Überreste stammen von 45 Fröschen, auch wohl eine Folge der Jagdhausbeute, die der nahe Teich dem Rauz bequem bot. Der Rest der Beutetiere waren Insekten, darunter Gelbrandkäfer, Maltkäfer, Mistkäfer, Getreidelaufräfer und einige Schmetterlinge. Die aus diesen Überresten hervorgehende Speisefarte des Waldfauzes ist demnach eine recht reichhaltige und zeigt uns wieder an, daß wir es beim Waldfauz mit einem überwiegend nützlichen Raubvogel zu tun haben.

Dr. H. W. Frickhinger.