die Beete in der Nähe des Bestandsrandes wesentlich schwächeren Pflanzenabgang durch Engerlinge.

Das Spritzen der Beete mit Schwefelkohlenstoff vor der Flugzeit, um die Maikäfer von der Eierablage abzuhalten, zeigte keinen Erfolg. Dagegen erwies sich das Bestreuen der Beete mit $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ kg per Quadratmeter eines stark nach Teer riechenden, von Oberförster Cunier in Harberg empfohlenen Pulvers (Zusammensetzung ist nicht angegeben), insofern als wirksam, als die nicht bestreuten Beete 5—6 mal mehr Engerlinge enthielten, als die bestreuten.

Das Bedecken des Bodens mit Laub hatte in einem Falle gute, im andern keine Wirkung.

Etwas über die Weymouthskiefer.

Im Stadtwalde von Münster im Oberessaß stockt auf II. Bonität für Tanne auf lehmigem Sande aus Granit ein 0,65 ha großer 70 jähr. Weymouthskiefernhorst, der im Dezember 1911 durch Sturm verlichtet wurde. Vorher hatte er genau 400 fm Verbholz mit Rinde auf dem Hektar, was einem Durchschnittszuwachse von 5,71 fm entspricht. 66 Windfälle hatten ergeben 40,77 fm Stämme und Abschnitte ohne Rinde gemessen, 18,20 fm Schichtnutzholz und 7,70 fm meist anbrüchiges Brennholz, da viele Stämme bereits auf 1—2 m als stockfaul sich erwiesen. Nutzholzprozent einschließlich zuzurechnender Rinde fast 90%.

Erzielte Preise für Festmeter Stämme und Abschnitte durchschnittl. 15,80 M, für Festmeter Schichtnutzholz 9,15 M, für Festmeter Brennholz 4,40 M, für Festmeter Gesamtholzmasse 12,70 M.

Dieser nicht ungünstigen Bewertung steht abgesehen von der früh eingetretenen Stockfäule hinsichtlich des Anbaues der Weymouthskiefer die üble Erfahrung entgegen, daß diese schöne Holzart bei der vorjährigen Dürreperiode im Oberessaß neben der Fichte am allermeisten gelitten hat: sie ist in Aufforstungskulturen von oben nach unten zu zusehends verborrt.

Diese Erfahrungen werden Anlaß geben, ihre Verwendung auf gruppenweisen Anbau in etwa mittelgroßen Lücken auf frischen Böden einzuschränken.

Oberforstmeister Dr. Kahl, Metz.

Pflanzenschutzmittel.

(Aus den Mitteilungen der Chemischen Fabrik Flörsheim a. M., Dr. Nördlinger.)

Bekämpfung der Blattläuse mit Floria-Quassia-Seife.

Die Quassiaeisenbrühe gilt allenthalben als ein gutes Mittel zur Bekämpfung der Blattläuse wie anderer Schädlinge; da aber ihre Herstellung aus dem nicht überall leicht zu beschaffenden Quassiaholz umständlich ist, hat die Fabrik die Quassiaeise als fertiges Präparat hergestellt.

Von dieser Seife werden 20—30 g in 1 l Wasser, am besten Regenwasser unter kräftigem Umrühren gegossen. Die mit Blattläusen besetzten Pflanzen bespritzt man mit dieser Lösung mit Hilfe einer Pflanzen- oder Weinbergspritze, wobei darauf zu achten ist, daß auch die Unterseite der Blätter getroffen wird, da hier die Blattläuse vorzugsweise sitzen. Die Bespritzung wird zweckmäßig nach einem Tag wiederholt und hat das rasche Absterben sämtlicher Blattläuse zur Folge.

(Der Preis der Seife beträgt für ein Postkolli zu ca. $3\frac{1}{2}$ kg 6,50 M, für eine Kiloflasche 2,50 M.)