Skala der möglichen Mischungsverhältnisse Methämoglobin: Oxyhämoglobin zu erzeugen vermag. Während aber bereits durch einen geringen (etwa 2—3fachen) Überschuß an Ferricyanidäquivalenten der letzte Rest Oxyhämoglobin in Methämoglobin verwandelt wird, sind vom Chinon annähernd hundertmal soviel Äquivalente erforderlich. Dementsprechend sind auch in geringeren Konzentrationen die Umsätze geringer. Die charakteristischen Eigenheiten der umkehrbaren Reaktion treten in dem System Blutfarbstoff—Chinon noch viel stärker hervor als in dem System Blutfarbstoff—Ferricyanid.

Berichtigung zu der Arbeit

»Studien über Methämoglobinbildung«, III. Mitteilung¹⁾.

Infolge einer erst nachträglich bemerkten Gedankenlosigkeit wurden die in der Arbeit benutzten Feinmanometer als »Differentialmanometer« bezeichnet (S. 131—132). Es handelte sich jedoch nicht um diese, sondern um die gewöhnlichen Manometer nach Barcroft, die auf einer Seite offen mit der Atmosphäre kommunizieren.

W. Heubner.

---

1) Dieses Archiv Bd. 100, S. 128—136.