schlauch des reziproken *muricata*-Plasma und *biennis*-Kern. Es kommt demnach jetzt ein *biennis*-Kern wieder in *biennis*-Plasma, und wenn auch hier der Eikern (*muricata*) zugrunde geht, so entsteht wieder eine reine *biennis*-Pflanze¹⁾.

Es ist also ein sehr großer, bisher völlig unverständlicher Tatsachenkomplex durch diese wunderhübsche Entdeckung klargelegt.

Daß die Frage, welche Eigenschaften durch den Kern, welche durch das Plasma übertragen werden, jetzt an der Hand dieser *Oenothera*-Bastarde sehr weitgehend zu klären sein wird, daß jetzt hier eine Menge von Fragen experimentell angefaßt werden kann, das braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Eine Frage, die noch durch weitere Versuche geklärt werden muß, ist die, ob die beiden reziproken Bastarde *O. biennis* $\times$ *muricata* und *O. muricata* $\times$ *biennis* wirklich, wie de Vries angibt, und wie auch Goldschmidt voraussetzt, absolut konstant sind. Ref. ist davon nicht überzeugt, er hat 1907 und 1908 in F_2 des Bastardes *muricata* $\times$ *biennis* in einzelnen Charakteren, so vor allem in der Blütengröße und -form, doch recht auffällig abweichende Typen gefunden. Der naheliegende Gedanke, daß in diesem Falle der *biennis*-Elter nicht konstant gewesen sein könnte²⁾, gibt keine Erklärung, weil ja nur ein haploider *biennis*-Kern in den Bastard gekommen ist.

Ein weiterer Punkt, auf den Ref. hinweisen möchte, ist der, daß er 1908 in mehreren Kreuzungen gefunden hat, daß immer in F_1 der Kreuzung *muricata* $\times$ *biennis* ein sehr großer Prozentsatz der Keimlinge weiß-buntblättrig war³⁾ und das auch weiterhin blieb, während in F_1 der reziproken Kreuzung der jeweils gleichen beiden P_1 -Pflanzen nie bunte Pflanzen auftraten. In der Nachkommenschaft der betreffenden *muricata*- und *biennis*-Pflanzen, die durch Selbstbestäubung gewonnen war, sind dabei weißbunte Pflanzen nicht aufgetreten. Auch de Vries berichtet an einer dem Ref. z. Z. unauffindbaren Stelle über das Auftreten buntblättriger Individuen aus der Kreuzung von *O. muricata* ♀ $\times$ *biennis* ♂.

Die interessanten Ergebnisse der zytologischen Untersuchung dieser bisher so unverständlichen *Oenothera*-Bastarde legen es nahe, an in gewisser Hinsicht ähnliche Vorgänge auch bei den sonderbaren *Malva*-Bastarden zu denken, über die Hedlund — bisher freilich nur vorläufig — berichtet hat.

Baur.

Lutz, Anne M. Triploid Mutants in *Oenothera*. Biologisches Centralblatt 32 (1912). S. 385—435.

Stomps, Theo J. Die Entstehung von *Oenothera gigas* de Vries. Berichte d. Deutsch. Bot. Ges. 30 (1912). S. 406—416.

Stomps, Theo J. Mutation bei *Oenothera biennis* L. Biolog. Centralbl. 32 (1912). S. 521—535.

Miß Lutz berichtet über zytologische Untersuchungen einiger *Oenothera*-Formen mit *gigas*-Eigenschaften. Drei habituell verschiedene Formen wurden gefunden, von denen zwei *Lamarckiana*- und *gigas*-Charaktere verschiedenartig kombiniert zeigten, während die dritte eine Kombination *gigas-lata* darstellte. Sie hat also ähnliche Formen, wie der Ref. Partial- und Doppel-

¹⁾ Die allerdings — das möchte Ref. zu bedenken geben — vielleicht teilweise noch *muricata*-Chromatophoren besitzt!

²⁾ Die Blütengröße ist in der Tat bei verschiedenen *biennis*-Sippen in der Nähe Berlins verschieden und scheint einfach zu mendeln.

³⁾ Dem Aussehen nach ganz wie die „*aibomaculata*“-Sippen von *Mirabilis* und *Antirrhinum*.