Fröschen ausgeführt, und die Entwicklungsschwankungen der Daumenschwielen als Indikator benutzt. Auch er fand sie stets fast völlig rückgebildet beim Kastraten und nach Hodeninjektion wieder annähernd normal entwickelt. Es zeigte sich aber weiter die erwartete gleichsinnige Wirkung der Ovarialeinführung. Und zwar trat präzise Umgrenzung der (3—4) Drüsensfelder, Verstärkung der Epidermis und Vergrößerung sowie Vermehrung der Drüsen in beiden Fällen gleichmäßig deutlich, wenn auch in verschiedenem Grade hervor. Während aber bei Hodeninjektion nur die histologische Entwicklung und Wandstärke der Drüsen der Stufe des Kastraten nahe blieb, ließen die mit Ovarialsubstanz behandelten Tiere außerdem auch die Epithelhöcker gänzlich vermissen. Auch schien die Zeit der Injektion nicht bedeutungslos: am günstigsten der Herbst, wohl als Termin des normalen Regenerationsbeginns; Winterversuchstiere zeigten mehrfach nur geringen Vorsprung vor Kastraten.

Ohne diesen feineren Unterschieden und dem inneren Mechanismus des Geschehens vorläufig erklärend weiter nachzugehen, begnügt sich Verf. nach kurzer Erörterung der Literatur mit der Feststellung, daß seinen Versuchsergebnissen nach die „von den Geschlechtsdrüsen durch innere Sekretion abgegebenen Stoffe“ nicht „entwicklungsauslösende oder form-erhaltende Reizmittel für die spezifischen Organe des zugehörigen Geschlechts“ seien, sondern „Stoffe, die zu dem allgemeinen Haushalt des Körpers“ nötig sind.

Brüel.

Kellogg, Vernon L. An Experiment in double Mating. Science, N. S., vol. 33, 1911, p. 783—789.

Castle, W. E. Double Mating of Silk-Worm Moths. Ibid. vol. 34, 1911, p. 15—21.

Mit „double mating“ versteht Kellogg die Paarung ein und desselben Weibchens mit zwei Männchen verschiedener Rasse. In den Versuchen gehörte in der Regel das eine Männchen derselben Rasse wie das Weibchen an.

In einer früheren Arbeit hat Kellogg festgestellt, daß verschiedene Merkmale des Seidenspinners den Mendelschen Regeln folgen; in der vorliegenden hat er das Verhalten derselben bei der Doppelbefruchtung untersucht, berichtet jedoch vorläufig nur über die Vererbung der Kokonfarbe. Es handelt sich um die Rassen Bagdad White (BW), Istrian Yellow (IY) und French Yellow (FY). Die gelbe Farbe ist über die weiße dominant, aber BW kann auch über FY dominieren. Da jedes Ei nur durch ein Spermatozoon befruchtet wird, und die Spermien sich vermutlich in der Bursa copulatrix gleichmäßig vermischen, würde man beispielsweise bei einer Kreuzung eines BW ♀ mit einem BW ♂ und einem FY ♂ erwarten, daß die F₁-Generation von ungefähr gleicher Anzahl reiner BW-Individuen und BW × FY-Hybriden bestände. Kellogg fand aber, daß die weißen F₁-Exemplare miteinander gepaart in F₂ zum Teil gelbe Kokons ergaben. Auch andere Unregelmäßigkeiten kamen vor, wodurch Kellogg die Ansicht beigebracht wurde, daß bedeutende Abweichungen von den Mendelschen Regeln vorliegen. Er fordert zum Schluß die Genetiker zur Erklärung der rätselhaften Verhältnisse auf.

Castle hat dieser Aufforderung Folge geleistet und findet die Lösung in dem Dominanzwechsel. Die weiße Farbe kann nämlich sowohl dominant als auch rezessiv sein, wie Coutagne, Toyama und auch Kellogg selbst nachgewiesen haben. Unter dieser Voraussetzung zeigen die Resultate Kelloggs tatsächlich eine weitgehende Übereinstimmung mit den Mendel-