Peebles, Fl. *Regeneration and Regulation in Paramaecium caudatum.* Biological Bulletin. 23, N. 3, 1912. S. 154—170.

Gleichzeitig mit Calkins (1911) untersuchte die Verfasserin die Regeneration und Regulation bei Infusorien (*Paramaecium caudatum*) und kommt im großen ganzen zu denselben Resultaten, welche Calkins durch das Experiment gefunden hatte. Die Paramäcien wurden so geteilt, daß das Hinterende, in welchem sich der Kern nicht befand, abgetrennt wurde. Es regenerierte eine große Anzahl von Tieren und die Teilung in zwei gleiche Teile erfolgte in 62%, ehe die Tiere ihre normale Größe wieder erreicht hatten. Die Teilung selbst war in 20% der Fälle nicht immer normal. Das kleinere Tier wuchs aber, bis es sich zum zweiten Male teilte, zur normalen Größe heran und teilte sich in zwei gleiche Teile oder in ein größeres und ein kleineres Tier. Entweder bildeten diese kleineren Tiere pathologische Formen aus oder gingen zugrunde. Im allgemeinen aber wuchsen nach mehreren Teilungen die Tiere zur Normalgröße der Rasse heran.

Wenn aber die Tiere so operiert wurden, daß das vordere Ende entfernt wurde und der Schnitt durch das Peristom gerade senkrecht zum *Macronucleus* geführt wurde, so regenerierten 34% diese Teilstücke den Verlust und teilten sich in zwei normal große Teile. 42% der Tiere teilten sich unregelmäßig. 50% der Tiere, welche eine Operation an dem vorderen Ende auszuhalten hatten, gingen zugrunde, während bei der Operation am hinteren Ende nur 20% zugrunde gingen. Werden aber die Paramäcien genau in die Hälfte geteilt, so sterben die Tiere gewöhnlich, weil der Kern durch den Druck des Messers aus dem Plasma getrieben wird. Bleibt aber zufällig der Kern in einem der Teilstücke, so regeneriert das Tier und es findet meistens eine normale Teilung statt. Die Bildung von pathologischen Formen findet stets dann statt, wenn mehr als die Hälfte des Protoplasmas dem betreffenden Stück verbleibt, niemals entwickeln sich abnorme Formen, wenn das Plasma halbiert ist. Werden Zellen während der Teilung durchschnitten, so erfolgt eine Regeneration der verlorenen Teile um so eher, je weiter die Teilung vorgeschritten ist. Operiert man die Tiere während der Konjugation, so stirbt das Tier, welches keinen Kern enthält, kurz nach der Operation, während die größeren Teilstücke mit Kernen zusammenbleiben oder sich sofort trennen. Diese Exkonjuganten regenerieren sehr langsam, und die spätere Teilung ist stark verzögert. Verschiedene Rassen verhalten sich in bezug auf ihre Regenerationsmöglichkeit verschieden. Auch der physiologische Zustand, wie er durch die Ernährung und die Umgebung bedingt ist, hat selbstverständlich Einfluß auf die schnellere oder langsamere Möglichkeit der Regeneration.

Die theoretische wichtige Frage, ob die Gestalt einer Rasse durch die Entfernung von Zytoplasma verändert werden kann, verneint die Verfasserin im Gegensatz zu den Ansichten Popoffs, der bei *Frontonia leucas* und *Stentor coerulesus* feststellte, daß kleinere Rassen aus kleineren Tieren entstehen könnten. Im Einverständnis mit Jennings behauptet die Verfasserin nach sorgfältig geführten Einzelkulturen, daß operierte Tiere entweder sofort oder nach mehreren Generationen auf die normale Größe dieser Rasse heranwachsen. Durch ihre Versuche hat die Verfasserin den Beweis erbracht, daß das vordere Ende des Tieres stärker differenziert ist und infolgedessen die Regenerationsmöglichkeit bei der Entfernung des vorderen Endes sich vermindert. Das hintere Ende, als das weniger differenzierte kann leichter regeneriert werden und die Normalform der Teilung stattfinden.

Erdmann (Berlin).