Berichtigung

von H. Weese, W.-Elberfeld.

Durch Dr. Dr. Joachim Gutschmidt-Berlin bin ich auf eine irrtümliche Zahlenangabe in Tabelle 2 meines Referates¹ über „Moderne Schlafmitteltherapie und Basisnarkose“ aufmerksam gemacht worden. Im Interesse der klaren Darstellung wird deshalb die ganze Tabelle 2 nachfolgend nochmals veröffentlicht.

Tabelle 2.

Substanz	Dosis	°/o Gesamtausscheidung an Barbitursäuren	Umwandlungsprodukt in °/o der zugeführten Barbitursäure	Dauer der Nachausscheidung	Untersuchungsobjekt
Diäthylbarbitursäure (Veronal)	14 × 1,0 g 16 × 0,5 g	65,1 71,4	—	> 9	klinisch
Diallylbarbitursäure (Curral)	in 11 Tgn. 1,9 g bzw. i. 4 „ 0,8 g	26,5 31,1	—	9	„
Äthylphenylbarbitursäure (Luminal)	3 × 0,3 g 3 × 0,6 g	24,5 11,2	—	< 11	„
Äthyl-i-propylbarbitursäure (Numal)	in 8 Tgn. 1,6 g „ 11 bzw. in 8 Tgn. 2,4 g	12,9 23,5	—	5	Hund
Äthylcyclohexenylbarbitursäure (Phanodorm)	10 × 0,5 g bzw. 0,4 g	17,8 21,5	12,5—19,0 % als Äthylcyclohexenylbarbitursäure.	2—3	klinisch
Isopropylbrompropenylphenylbarbitursäure (Noktal)	3 × 0,6 g 7 × 1,0 g	8,3 17,9	5,0—9,8 % als Isopropylazetonylbarbitursäure	4	„
Butylbrompropenyl-Na (Pernokton)	in 10 Tgn. 3,0 g „ 8 „ 2,4 g	12,9 12,6	5,3—16,9 % als sek. Butylazetonylbarbitursäure	3—4	„
Methylcyclohexenyl-N-methylbarbitursäure (Evipan)	1,6 g i. v.	1,52	?	—	Hund

¹ Naunyn-Schmiedebergs Arch. 181, 46 (1936).