Buchbesprechungen [Book reviews]

Newig, J. & Theede, H. (Hrsg.): **Die Ostsee**. Husum: Husum Druck- und Verl.Ges., 1985, 272 pp., DM 98,-.

Unter der Herausgeberschaft von J. Newig und H. Theede, beide als Hochschullehrer in Kiel tätig, ist ein thematisch weit gefaßtes, reich bebildertes Buch über den Natur- und Kulturraum Ostsee entstanden.

Das Werk wird getragen von 45 Autoren und Autorinnen, die in 55 Beiträgen ihr Sachwissen, ihre Erfahrungen und Impressionen ausgebreitet haben. Es behandelt in der Reihenfolge der Darstellung Themen aus Kunst, Geschichte, Wirtschaft und Verkehr, Geologie und Geographie, Küstenlandschaften und Inseln, Städte, Freizeit, Tiere und Pflanzen sowie Ökologie und Naturschutz. Bei dem großen Mitarbeiterkreis, in dem Vertreter aus allen Ostseeanrainerstaaten zu Worte kommen, ist es nicht überraschend, daß die einzelnen Beiträge unterschiedlich in Stil und Inhalt ausgefallen sind. Geographische Aspekte nehmen dabei einen breiten Raum ein. Etwa 20 Beiträge sind ausschließlich oder teilweise meeres- und umweltbezogenen Themen gewidmet; sie vermitteln eine gute Einführung in die biologischen und hydrographischen Besonderheiten, aber auch in aktuelle Problembereiche der Ostsee.

Es ist heutzutage ungewöhnlich, daß ein unter internationaler Beteiligung zustande gekommenes, sachkompetentes Buch nicht in englischer Sprache erscheint. So ist dieses Gemeinschaftswerk – zugleich politische Grenzen überbrückend – als Bereicherung des deutschen Büchermarktes besonders zu begrüßen. Studenten, Lehrer, Schüler und Naturfreunde werden diese Neuerscheinung mit Gewinn zur Hand nehmen. Dem auch von der Aufmachung ansprechenden Werk ist ein breiter Leserkreis zu wünschen.

H.-P. Bulnheim (Hamburg)

Richardson, J. G. (Ed.): **Managing the Ocean. Resources, Research, Law**. Mt. Airy, Md: Lomond Publ., 1985, 407 pp., \$ 28.95.

Das Buch enthält 33 Arbeiten von 36 Autoren sowie zwei unsignierte Abhandlungen. Das weite Feld der behandelten Probleme erschwert es erheblich, hier einen umfassenden Überblick zu geben. Nun ist aber der Meeresbiologe an manchen Fragestellungen auch nicht sonderlich interessiert. So erlebt er das neue Seerecht eigentlich nur in der Leideform und hat daher für kritische Stimmen mehr Verständnis als für begeisterte Zustimmung. Die Aspekte der künftigen militärischen Nutzung der Ozeane verheißen keine schönere Welt, und der mythisch verklärte Blick auf das Meer sagt dem hier arbeitenden Naturwissenschaftler ebenfalls nicht sonderlich zu, auch wenn viele große Geister der Menschheit beschworen werden. Ein Überblick über die zahlreichen mit dem Meer befaßten internationalen Organisationen ist nützlich, aber wohl kaum von größerem Bildungswert.

Die noch verbleibenden 23 Artikel berichten über Möglichkeiten der Energiegewinnung, über Unterwasserarchäologie vor den Nilmündungen und über die theoretischen und praktischen Probleme bei der Entstehung und Ausbeutung untermeerischer Lagerstätten von Erzen und Erdöl. Ferner werden Informationen vermittelt über die Möglichkeiten der Satellitenbeobachtungen insbesondere für die Klimaforschung, hinsichtlich der Veränderungen der Gletscher bei Klimaschwankungen und hinsichtlich der Geotektonik der Arktis.

In diese Betrachtungen wird wiederholt die Biologie mit einbezogen, sei es im Rahmen einer Bilderserie über ein Schutzgebiet, zur Diskussion biogeochemischer Kreisläufe, im Zusammenhang mit regionalen Betrachtungen (Indien, Ostsee) oder bei der Diskussion von Zukunftsperspektiven.

Biologische Themen sind vertreten durch die Beschreibung von Ökosystemen und deren Beeinflussung durch den Menschen, durch die Diskussion des Übergangs zu Kulturmaßnahmen (Aquakultur), durch Untersuchungen über das Verhalten von Seevögeln und durch Angaben über die medizinische Bedeutung von Meeresorganismen.

Wie aus dieser Übersicht zu ersehen, fehlt es dem Buch weitgehend an innerer Geschlossenheit und einer klaren Herausarbeitung des eigentlichen Themas. Dies ist um so bedauerlicher, weil einige – vor allem umfassende – Arbeiten die Herausgabe dieses Werkes durchaus rechtfertigen.

M. Gillbricht (Hamburg)

Ax, P.: **Microfauna Marina**. Vol. 2. Stuttgart: Fischer, 1985, 410 pp., DM 89,–

Nur wenige Monate nach Erscheinen des ersten Bandes liegt nunmehr Band 2 von "Microfauna Marina" vor. Die neue Ausgabe dieser Buchreihe präsentiert sich in gleich geschmackvollem Kleide, ist aber an Umfang (410 pp.) und Autorenzahl (15 Beiträge) wesentlich gewachsen.

Die teils in deutscher, teils in englischer Sprache abgefaßten, voneinander unabhängigen Spezialbeiträge widmen sich systematisch-taxonomischen und ökologischen Untersuchungen; auch werden in vier Arbeiten Ultrastruktur-Befunde von verschiedenen Vertretern der mikrobiellen Meeresfauna abgehandelt.

Im Vordergrund stehen taxonomische Beiträge an diversen Plathelminthen, Nematoden, Oligochaeten und Harpacticoiden. W. Mielke beschreibt in einer umfangreichen Arbeit (90 pp., 53 Abb.) insgesamt 14 Arten von Harpacticoiden (11 davon neu) aus zentralen Landesteilen von Chile; die Skizze eines dieser n. sp.-Vertreter zielt auch den Einband der neuen Ausgabe. D. Blome liefert mit der Folge XXXV eine Fortsetzung der Galapagos-Reihe, wobei insgesamt 23 Arten der Familie Chromadosidae (Nematoda) vorgestellt werden. Hervorgehoben sei eine interessante Untersuchung von O. Noldt an drei Schizorhynchia-Arten (Plathelminthes) mit phylogenetischer Zielrichtung.

Drei ökologisch orientierte Arbeiten befassen sich mit Untersuchungen an Plathelminthen aus Sand- und Schlickwattgebieten bei List auf Sylt. B. Scherer analysiert die "Annual dynamics of a meiofauna community from the 'sulfide layer' of a North Sea sand flat", wobei er ohne Berücksichtigung von Harpacticoiden und Nematoden insgesamt 104 Arten identifizierte.

In den erwähnten EM-Studien wurden die Statocyste und Hautdrüsen bestimmter Plathelminthen, das Protonephridialsystem der Nemertinen und in einer hervorragenden Studie der Pharynxapparat der Nerillidae (Polychaeta) untersucht, wobei S. Puschke brillant angefertigte Rekonstruktionszeichnungen vorlegt.

"Microfauna Marina" hat sich zum Ziel gesetzt, "das Spektrum unterschiedlichster Aspekte der Ökologie, Systematik und Evolution, der Morphologie und Ultrastruktur ebenso wie der Lebensweise dieser Faunenkomponente des Meeres" zu erschließen. Wegen des Angebots an Spezialabhandlungen ist der Nutzerkreis der Buchserie wohl begrenzt, dürfte sich aber in Expertenkreisen besonderer Wertschätzungen erfreuen.

G. Uhlig (Helgoland)

Sterrer, W. (Ed.): **Marine Fauna and Flora of Bermuda**. A Systematic Guide to the Identification of Marine Organisms. New York: Wiley, 1986, 742 pp., £ 95.45.

As the subtitle explains, this book is a guide to the identification of marine organisms. A selection of over 1500 species occurring on and in the vicinity of the Bermuda seamount are described and illustrated. The organisms range from blue-green bacteria to flowering plants found on the shoreline, and from single-celled animals to most frequently sighted whales off Bermuda. They probably represent the majority of species a serious explorer is ever likely to encounter.

The natural system of the organisms provided the frame work for the organization of the book into sections and chapters. Although a multitude of authors contributed to this book, it is pleasant to notice that within chapters the data for the various taxa are uniformly and clearly arranged: the introduction provides information, a.o. on occurrence, biology and development, and the taxonomic part gives diagnoses down to species. This work benefits from the experience that keys to species identification are most useful to readers when accompanied by figures and that dichotomous keys are often burdened by ambiguous constraints. Thus, the book appeals by excellent, carefully executed illustrations assembled to black-and-white plates the majority of which represents

taxonomic units. Other illustrations show typical developmental stages and schematic drawings of organisms with explanation of terminology. In addition, there are 16 colour plates with a profusion of beautiful photographic reproductions of algae and invertebrates. A voluminous section with references, a glossary and a taxonomic index conclude the book.

The language of the text is clear and concise, and the print is easy to read. Though referred to as a field guide, I consider this volume to be too valuable, and too heavy, to be taken into the "field", a wetlab on board ship or on a diving expedition.

More than 4500 species are known from Bermuda waters and shores. Only a limited number could be accommodated in the volume at hand. In view of the facts, one may question the editor's claim to have given "relatively more space" to plankton species: Of the many and nearly ubiquitous Copepoda (over 540 species) merely 5 % of the species were selected, of the Calanoida even (400 species) only 2 %.

"Marine Fauna and Flora of Bermuda" fully gives what the editor stated as its purpose; "to reveal the beauty and order in marine life by introducing the reader to the organisms that inhabit the ocean around Bermuda". The book will have use much beyond these waters. It well deserves to be highly recommended to "scientists, teachers, students and other nature lovers" for whom it was designed to serve as guide.

K. Hülsemann (Hamburg)

George, J. D. & Hartmann-Schröder, G.: **Polychaetes: British Amphinomida, Spintherida and Eunicida**. (Synopsis of the British Fauna. N. S. Nr. 32). London: Brill, 1985, 221 pp., Hfl 72,-.

Die Darstellung dieser drei Taxa ist die erste aus einer Reihe von elf, die die gesamte Polychaetenfauna der Britischen Inseln taxonomisch aufarbeiten soll. Das erfaßte Faunengebiet reicht im Süden von der Bretagne bis zur Nordspitze Jütlands, schließt also auch den gesamten deutschen Nordseebereich mit ein und ist deshalb auch für deutsche Meereszoologen von besonderem Interesse.

Das Erscheinen einer jeden modernen Polychaetenfauna und der von den Herausgebern angestrebte Ersatz der Fauvel'schen Fauna ist nachdrücklich zu begrüßen, denn ohne Zweifel gehören die Polychaeten zu den heute noch für Nichtspezialisten am schwierigsten zu bestimmenden marinen Organismen. Die Autoren erleichtern den Einstieg in die Gruppe durch einen Überblick der allgemeinen Polychaetenmorphologie, Ernährung und Fortpflanzung, ein dreiseitiges Glossar der wichtigsten morphologischen Termini und ein ausführliches Kapitel über Sammeln, Fixieren und Aufbewahren. Durch neuentwickelte Schlüssel zu den Ordnungen und Familien wird versucht, dem unerfahrenen Benutzer das Bestimmen zu erleichtern. Beide Schlüssel mit ihren sparsamen, wenig erklärten Zeichnungen überfordern aber wohl den Anfänger. Die einzelnen Artbeschreibungen bestehen jeweils aus einer Seite Text mit Angaben über Vorkommen und Verbreitung sowie einer Seite Abbildungen. Sie sind keine Neubearbeitungen, sondern wurden weitgehend unverändert z. T. aus Beschreibungen außerhalb des Faunengebietes aus der Literatur übernommen. Das Bestimmen wird vor allem dort erschwert, wo z. B. Zeichnungen auf Kiemen oder wenige Borsten beschränkt bleiben. Bestimmung der kleinen, auch für Spezialisten morphologisch nur schwer oder gar nicht zu unterscheidenden Dorvilleiden mit der wichtigen Gattung *Ophryotrocha* ist nach diesem Bändchen kaum möglich.

Insgesamt spiegelt die Bearbeitung die zum Teil unbefriedigende Situation in der Polychaetentaxonomie und demonstriert die Schwierigkeiten für jeden Autor, unvollständig beschriebene Arten im Rahmen einer derartigen, Vollständigkeit beanspruchenden Zusammenstellung darstellen zu müssen.

W. Westheide (Osnabrück)

Hayward, P. J.: **Ctenostome Bryozoans**. (Synopsis of the British Fauna. N.S. Nr. 33). London: Brill, 1985, 169 pp., Hfl. 56,-.

The order Ctenostomata is a bryozoan group which is really difficult to cope with – not only for beginners. This is shown again by Hayward's booklet. Although Hayward has considered many of the newer publications, he maintains several of the already disproved interpretations picked up from older literature. Thus, Hayward continues asserting that the stolons are "kenozooids" but

ignores the increasing number of facts which disprove this interpretation, and provides no updated arguments for his opinion. If the stolons in the Ctenostomata were "kenozooids" and thus real individuals, a forebody (polypide) beginning to develop in one (asserted) individual, the stolon, would become the forebody of another (asserted) individual during later ontogeny; this lacks every logic. By omitting essential details in Figure 3, Hayward has falsified a draft published formerly by the reviewer (Jebram, 1973). Since essential information has been eliminated from the original figure, Hayward has produced the impression that essential details of the ontogenetic development had been overlooked in the illustration presented in 1973 as well as the impression of an upset interpretation.

The booklet contains various other errors and misleading statements; only a few prominent cases can be mentioned here. Hayward has followed some older publications, in which (based upon erroneously discriminated, preserved material or even only on misunderstood literature!) the validity of the genus *Tanganella* was denied; however, there are more and stronger anatomical and ontogenetical differences between *Tanganella* and *Victorella* than between *Victorella* and *Bulbella* – the latter being accepted by Hayward. This author has dared to pass judgement on the taxonomy of the victorellids, although he has admitted to having seen only a few preserved specimens; decisive characteristics in this group can be ascertained, however, only in living, well cultivated colonies. Hayward's description of *Vesicularia spinosa* is contradictory in itself; from a comparative, morphological view it is of importance to stress the fact that, contrary to Hayward's initial statement (p. 17), the trophons ("autozooids" in Hayward's usage) are well arranged in a fairly regular pattern in this species (at least in young colony parts): usually 3 similarly spaced trophons per stolon, and always in a distinct median line on the frontal side. Comparison with the ontogeny of *Bowerbankia* reveals that the medio-frontal position of the trophon-anlage is doubtlessly a plesiomorphic feature within the Vesiculariidae. In the key and in the characterizations of the species of *Bowerbankia* (also in other genera) Hayward uses predominantly those characters which according to experimental results are, to various extents, modified by food and other external factors (even in *Bowerbankia*): sizes of trophons, colour of polypides, colour of the reserves in embryos and lasting buds, width of stolons, encrusting or erect growth; wrong species discrimination may be caused by this. Hayward has provided a voluminous discussion of the genus *Alcyonidium*, which, nevertheless, has left various open questions and unsafe characterizations. In the preceding key the non-specialist may be misled in the decision between *Flustrellidra* and *Alcyonidium*: *A. hirsutum* is not simply "papillate"; these "papillae" are often well pointed and thus to be considered as "conspicuous spines", while in *F. hispida* under some conditions (even in the habitat) spine formation may be strongly reduced or sometimes the spines be masked by silt as is the case in *A. parasiticum*. The key for the species of *Alcyonidium* is still uncertain and misleading in several places.

Various errors and insufficiencies in this booklet originate from predominantly investigating preserved specimens. This commonly used method, however, is unsuitable for various parts of the Ctenostomata. I very much regret that Hayward's contribution not only continues imprinting a regarding the facts nonpertinent arrangement of the ctenostome sub-groups ("Carnosa" and "Stolonifera") on the reader's mind but also supports a further increase of erroneous records and doubtful literature regarding various lower taxa.

D. Jebram (Braunschweig)

Vauk, G.: **Naturdenkmal Lummenfels Helgoland**. Otterndorf, Helgoland: Huster, 1985, 104 pp., DM 45,-.

Der Lummenfels Helgolands ist die einzige Brutstätte der Trottellummen in der Bundesrepublik und das kleinste Naturschutzgebiet Deutschlands. Ihm widmet der langjährige Leiter der Inselstation der Vogelwarte Helgoland diese umfassende und prächtige Monographie.

Den größten Raum nehmen 108 farbige, teils ganzseitige Abbildungen ein. Sie zeigen, auch in Nahaufnahmen, die in großer Zahl auf Felsbändern, Vorsprüngen und Nischen des Buntsandsteinmassivs lebenden und brütenden Vögel und Vogelgemeinschaften. Zu ihnen gehören neben den Lummen auch Tordalke, Austernfischer, Brandgänse und Eissturmvögel.

Der Textteil behandelt eingehend die Arten und ihre Häufigkeit. Die Tendenz ist stark zunehmend. So haben sich die Trottellummen von 775 Brutpaaren 1973/74 auf 2400 Brutpaare im Jahre 1984 vermehrt. Die Tordalke brüten seit 1975 wieder auf dem Felsen. Die Population der

Dreizehenmöwen ist gar von 8 (1952) auf 3000 Brutpaare (1984) angestiegen. Die Zahl der Silbermöwen wird künstlich niedrig gehalten, um eine Verdrängung anderer Arten zu verhindern.

Zwei Kapitel befassen sich mit der Geschichte der Helgoländer Seevögel und deren Bejagung und Verwertung durch die Helgoländer, die im 19. Jahrhundert eine größere Bedeutung hatte. Rezepte zur Zubereitung von Dreizehenmöwen fehlen nicht (nach Helgoländer und nach Hausfrauen Art).

Weitere Kapitel befassen sich mit der Entartung der Jagd durch Tourismus, Mode und Wissenschaft, mit dem Schutz und der Betreuung des Vogelfelsens sowie den Gefahren für den Lummenfelsen und dessen Bewohner durch Abbruch, Verölung und Umweltgifte.

Das Buch wendet sich gleichermaßen an Wissenschaftler, Naturfreunde und Heimatkundler. Es ist flüssig und interessant geschrieben, voller Einzelinformationen und Hinweise. Der Preis ist für ein Buch dieser Ausstattung erstaunlich niedrig. Somit ein Buch zum Selberhaben und zum Verschenken.
W. Gunkel (Helgoland)

Eppeley, R. W. (Ed.): **Plankton Dynamics of the Southern California Bight**. Berlin: Springer, 1986, 373 pp., DM 69,-

In der Serie „Lecture Notes on Coastal and Estuarine Studies“ ist als Band 15 ein Bericht über eines der bestuntersuchten Meeresgebiete der Erde erschienen. Das Buch ist John D. H. Strickland gewidmet, der 1963 die „Food Chain Research Group“ (FCRG) an der Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, Californien, gründete.

Acht führende Wissenschaftler des Instituts haben zusammengetragen, was aus Stricklands Initiative geworden ist. In acht Kapiteln behandeln sie grundlegend strukturelle (Carlucci, Eppeley & Beers), physikalisch ozeanografische (Jackson), chemische (Williams), organische und trophische (Beers) und produktionsbiologische (Eppeley & Holm-Hansen) Aspekte. Dem schließen sich eine Diskussion der räumlichen und zeitlichen Skalen und Muster (Mullin), eine Untersuchung des mikrobiellen Nahrungsnetzes (Azam) und eine Abhandlung über das Verhältnis von Mensch und Plankton (Eppeley) an.

Wer von dieser Zusammenstellung eine fachlich hervorragende Einführung in ein spezielles Ökosystem erwartet, sieht sich nicht enttäuscht. Die über zwanzigjährige Arbeit hat viele Früchte getragen, auf die in den jeweiligen Kapiteln besonders ausführlich eingegangen wird. Besonders eindrucksvoll ist die Kombination von In-situ-, Labor- und experimentellen Systemarbeiten.

Besonderes Interesse verdient Mullins Abhandlung über die Skalen im pelagischen Ökosystem. Auf der Basis breitgestreuter Messungen stellt er Hypothesen zur Interaktion verschiedenskaliger Prozesse auf. Auch wenn er feststellen muß „What we do not know is the relation (or coupling) between these scales“, ist der gedankliche Ansatz richtungsweisend für die Fortsetzung der Bearbeitung des pelagischen Ökosystems der Bucht von Südkalifornien.

Vielleicht wäre es hilfreich, den ehrenvollen Namen der „Food Chain Research Group“ dabei im historischen Kontext zu sehen und das vorhandene Material zu einer systemanalytischen Untersuchung zu nutzen, so wie im Text der Begriff „food chain“ bereits weitgehend durch „food web“ und „cycles“ ersetzt wurde. Grundlage für eine systemökologische Untersuchung bietet bereits das hier zusammengestellte Material in reichem Maße.

Es versteht sich, daß der Band mit einer 48seitigen Bibliographie und zwei Indices ausgestattet ist, die den Zugang zu weiterführender Literatur und zu speziellen Abschnitten des Buches erleichtern.
W. Greve (Hamburg)

Rheinheimer, G.: **Aquatic Microbiology**. 3rd ed. Chichester: Wiley, 1985, 257 pp., £ 17.95.

Nach fünf Jahren ist eine weitere englischsprachige Auflage des bekannten Buches von Rheinheimer erschienen. Seit der ersten Publikation 1971 hat es bisher vier deutsche, drei englische und eine polnische Auflage erlebt. Eine spanische und die zweite polnische Auflage stehen kurz vor dem Erscheinen. Dieser große Erfolg der Buchpublikation auf einem Spezialgebiet spricht für sich. Das Werk hat seinen festen Platz als Einführungs-, Lehr- und Nachschlagebuch (nicht zuletzt durch das umfangreiche Literaturverzeichnis von 23 Seiten) gefunden.

Gegenüber der zweiten Auflage (vgl. Rezension in *Helgoländer Meeresunters.* 34, 518–519, 1981) ist die Zahl der Seiten um 22 und die der Abbildungen um 11 vermehrt. Die Literaturangaben sind um 6 Seiten, der Preis um £ 7.95 erhöht worden. Eine Erweiterung um neue Kapitel fand nicht statt. Das im ganzen ökologisch ausgerichtete Buch behandelt Bakterien, Cyanobakterien, Pilze und Viren der Seen, Flüsse und Meere sowie ihre Verbreitung; den Einfluß von physikalisch-chemischen und biologischen Faktoren auf die Mikroorganismen; Einflüsse von Mikroorganismen auf Pflanzen und Tiere; die Rolle der Mikroorganismen im Stoffkreislauf des Meeres und in Ökosystemen; die Rolle der Mikroorganismen bei der Sedimentbildung, der Braunkohle und des Erdöls sowie von Schwefel und Erzlagerstätten; Mikroorganismen und Wasserverschmutzung sowie die ökonomische Bedeutung der Mikroorganismen. Das Buch ist leicht verständlich und flüssig geschrieben.

In den letzten Jahren sind gerade auf dem Gebiet der Meeresmikrobiologie sehr viele Veröffentlichungen erschienen, die unsere Kenntnis von den Umsetzungen im Meer bereichern haben. Diese Fülle adäquat zu berücksichtigen, ohne das Buch gewaltig anschwellen zu lassen, dürfte für den Autor nicht leicht gewesen sein. Es erscheint unausbleiblich, daß hier unterschiedliche Ansichten bestehen und manche Kollegen andere Prioritäten gesetzt hätten. Statt hierfür Beispiele anzuführen, möchte der Referent vorschlagen, den Autor durch Hinweise, Sonderdrucke und Reports zu unterstützen. Dies würde ihm auch die fast unlösbare Aufgabe erleichtern, bei allen Einzelfragen auf dem laufenden zu bleiben. Sicher werden weitere Auflagen in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Das Buch wird wärmstens empfohlen!

W. Gunkel (Helgoland)

Giam, C. S. & Dou, H. J.-M. (Eds): **Strategies and Advanced Techniques for Marine Pollution Studies: Mediterranean Sea.** (NATO ASI Series. G.: Ecological Sciences. Nr 9). Berlin, Springer, 1986, 475 pp., DM 190,—

Dieses Buch ist wirklich eine Zumutung! This book is sheer impudence! It presents the 'Proceedings of the NATO Advanced Study Institute Symposium' held at Beaulieu-sur-Mer, France, 1984. In the acknowledgement we read: . . . "We thank NATO . . . Without this grant, this meeting would never have happened" – and this surely would have been no loss to science.

The preface of the volume was written by B. L. Bayne. Even though his comments have been mouthed by him before on many occasions, it appears to me that his good name is being abused as 'make up' for the presentation of a lousy book. The volume contains almost 30 contributions of which only three deal with the Mediterranean Sea. All the other papers treat general subjects on pollution such as analytical techniques. The majority of the contributions are of the „what-should-be-done" type and hardly any valuable information can be extracted from them. The title of the book deceives the potential buyer.

After reading through the volume, one notices that it is a carelessly compiled concoction of papers produced in conference-manuscript style, in poor printing and with poor artwork, with figures and tables at times at the end of the contributions – an inappropriate way of presenting data. The pages display frequently irregular margins, as they are photostat copies of manuscripts; evident through the clearly visible 'Tip Ex' corrections in the text. The literature is compiled according to everybody's gusto: in the text with names or numbers; under 'References' we find complete quotations but also the so highly 'appreciated' cheap-print quotations without titles.

I am very glad I did not have to buy this volume at the exorbitant price of DM 190,—. It is not worth the paper it was printed on – even though it might very well reflect the quality of the meeting.

H. v. Westernhagen (Hamburg)

Kinne, O. (Ed.): **Marine Ecology.** A Comprehensive, Integrated Treatise of Life in Oceans and Coastal Waters. Vol. V: Ocean Management. Pt. 3: Pollution and Protection of the Seas – Radioactive Materials, Heavy Metals and Oil. Chichester: Wiley, 1984, pp. 1091–1618, £ 56.50.

This book of 528 pages is Part 3 of Volume V of the opus magnum of Otto Kinne entitled 'Marine Ecology'. It is the final volume of the monumental series constituting Dr. Kinne's main spare-time life work that started in 1965.

Part 3 is essentially 3 books by distinguished authorities in their fields. An introductory chapter by Dr. Kinne summarizes with much insight the chapters that follow. The chapter 'Contamination due to Radioactive Materials' by D. S. Woodhead is a scholarly, up-to-date review on the effects of radioactive wastes discharged into the marine environment. Woodhead had access to a substantial Soviet literature on laboratory experiments with marine organisms exposed to radionuclides, through Professor G. G. Polikarpov of the Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopol, U.S.S.R., who collected and interpreted much of the Russian literature on the effects of radiation on developing fish embryos. Unfortunately, as noted by the author, the experimental data published on the effects of radiation from radionuclides in water on developing fish embryos are not particularly informative, because there is no way in which one can make either valid intercomparisons between the data, or predictive extrapolations to conditions as they might exist in a contaminated environment. My one criticism of this excellent chapter is that radioactivity and radiation units, which seem to be undergoing constant revision, were not defined and interrelated in a small table for the benefit of the reader.

The chapter 'Pollution due to Heavy Metals and their Compounds' was authored by G. W. Bryan, who summarized a quarter century of his own highly reputable work on the effects of metals on marine organisms and that of other investigators in this field. Factors that affect the bioavailability of metals to marine organisms are given, and there is a substantial section on bioaccumulation of metals. There appears, however, to be no cohesive, consistent and unified theory as yet concerning all factors involved in the biological availability of metals to all taxa of marine organisms.

The chapter 'Oil Pollution and its Management' was written by R. Johnston, who has had experience with oil pollution associated with North Sea oil production. While recognizing that oil is indeed messy aesthetically and can have a destructive effect on marine organisms, Johnston also points out that oil can be quite rapidly dispersed by physical processes in the sea, degraded by bacteria and photochemical processes, with evaporation passing its more volatile fractions into the atmosphere. Johnston concludes his chapter with a look at the costs of oil spills in terms of fisheries and cleanup. He suggests that money could be better spent in preventive measures. The chapter is a well balanced review of the impact of oil on the marine ecosystem and human health, followed by remedial measures and costs. Johnston has filtered a great deal of material written on the subject and has arrived at rational conclusions that are neither alarmist nor complacent.

The book as a whole is well edited, with very few grammatical and typographical errors. Each of the three main chapters has an extensive bibliography. The technical production is excellent with clear, type-set print in the text and tables and well-drawn and photographed figures. The book is handsomely cloth-bound with an attractive dust cover. It is definitely a "must", along with the rest of the books in this series, for university and college libraries, as well as for libraries of environmental laboratories of governments and consulting firms. This series has no peer as a reference on special topics written by experts in marine ecology.

To Dr. Kinne I say: "Bravo and congratulations on an outstanding contribution to the marine sciences in this final book of a valuable series."

M. Waldichuk (West Vancouver, Canada)