umgesetzt; dieses ist wasserlöslich und wird von Magen und Darm absorbiert. Die Giftwirkung der Bariumsalze haftet nach Mayerhofer und Meixner an der Base, die Säure spiele nur insofern eine Rolle, als sie die Löslichkeit bedinge. Es komme aber eben auch, wie bei allen Giften, darauf an, wieviel von dem Gifte in den Kreislauf aufgenommen wird, wobei der Füllungszustand des Magens, die Zusammensetzung seines Inhalts und die Größe der durch Erbrechen usw. wieder entfernten Giftmengen von Bedeutung sind. Die Giftigkeit des Bariums scheint für den Menschen nicht geringer zu sein, als für die gewöhnlich zu Versuchen verwendeten Säugetiere. Die kleinste tödliche Gabe von Chlorbarium soll bei innerlicher Darreichung nach den Angaben des Württembergischen Medizinischen Landesuntersuchungsamtes für 1 kg Körpergewicht 0,09 g — für einen 79-jährigen Mann also etwa 5–6 g — sein. Die Vergiftungserscheinungen bei Barium beginnen meist mit Erbrechen, wozu sich bald Durchfälle gesellen. Mayerhofer und Meixner schreiben: „Die eigentümlichste Erscheinung der Bariumvergiftung ist eine hochgradige Hinfälligkeit infolge zunehmender Muskelschwäche“, die sich zuerst in den Beinen bemerkbar mache, um schließlich auch die Sprachmuskeln zu ergreifen, wobei meist noch Schlingbeschwerden und starkes Kältegefühl auftreten. Das Bewußtsein bleibe meist bis zum Schluß erhalten.

Berichtigung.

In meiner Arbeit „Die Ermittlung des Wasserzusatzes zu Hackfleisch und Fleischwürsten“ (S. 173–181 des laufenden Bandes dieser Zeitschrift) ist auf S. 180, Zeile 4 von unten zu berichtigen: „Auch wir fanden bei Schweinefleisch bis zu 4,21.“

Die Worte „bei Rindfleisch Zahlen von 4,21–4,83“, beziehen sich, wie auch aus der früheren Mitteilung (Diese Zeitschrift 1916, **32**, 492) hervorgeht, nicht auf selbsthergestelltes Hackfleisch, sondern auf vom Metzger entnommenes, das natürlich gewässert sein kann. Diesen Zahlen für Rindfleisch kann daher eine Bedeutung als Beurteilungsgrundlage nicht beigelegt werden. Wohl aber bezieht sich die Zahl 4,21 bei Schweinefleisch auf selbst zerkleinertes Fleisch.

J. Großfeld.

Referate.

Gärungserscheinungen.

Karl Schweizer: Physiologisch-chemische Studien an der Hefezelle. (Mitteilungen a. d. Gebiete d. Lebensmitteluntersuchung u. Hygiene, veröffentlicht v. Schweizer. Gesundheitsamt, 1920, **11**, 193–215.) — Die Schlussfolgerungen, welche Verf. aus seinen Versuchen zieht, sind folgende: Beim Heforganismus lassen sich die typischen Vitamindemonstrationen, wenn es sich vielleicht auch nur um eine grobe Analogie handelt, durch Beobachten der Gärtätigkeit zahlenmäßig verfolgen. So wie Vögel, die mit geschältem Reis ernährt worden waren, Erscheinungen unvollständiger Ernährung zeigen, so hat das Hefeautolysat (bei 48–49° während 1–2 Tagen verflüssigte Preßhefe), das von den Membranen getrennt wurde, nur einen äußerst minimalen Nährwert, was auch von den Membranen allein zu sagen ist. Gibt man aber die beiden wieder zusammen, so haben sie wieder die gleiche Wirkung wie das ursprüngliche, vollständige Verdauungsprodukt. Diese Gesamtwirkung übertrifft die Summe der Einzelwirkungen der beiden getrennten Komponenten um das 5–6fache. In analoger Weise, wie eine sich als vollständig er-