Journal of Genetics, III, 107, 1914. — Haeckel, E., Die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzugung der Lebensteilchen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung der elementaren Entwicklungsvorgänge. Berlin, G. Reimer, 1876. — Kammerer, P., Vererbung erzwungener Farbveränderungen. IV. Das Farbkleid des Feuersalamanders. Archiv f. Entw.-Mech. XXXVI, 4, 1913. — Ders., Die Zeichnung von *Salamandra maculosa* im durchfallenden farbigen Lichte. Archiv f. Entw.-Mech., dieses Heft 1922. — MacBride, E. W., u. Jackson, A., The inheritance of colour in the Stick-Insect *Carausius morosus*. Proceedings of Royal Society London B, LXXXIX, 611, 1915. — Meissner, O., Biologische Beobachtungen an der indischen Stabheuschrecke *Dixippus morosus* Br. (Phasm. Orth.). Zeitschr. f. wissenschaftl. Insektenbiologie, V, 14; 55; 87, 1909. — Nabours, R. K., Studies of Inheritance and Evolution in Orthoptera. I. Journ. of Genetics III, 141, 1914. — Przibram, H., Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (Mantidae). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Archiv f. Entw.-Mech., XXVIII, 561, 1909. — Ders. und Brecher, L., Ursachen tierischer Farbkleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 83, 1919. — Ders., Ursachen tierischer Farbkleidung. II. Theorie. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 199, 1919. — Ders. und Dembowski, J., Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß, zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung, III. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 260, 1919. — Schleip, W., Der Farbwechsel von *Dixippus morosus* (Phasmidae). Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. allg. Zool. u. Physiol., XXX, 45, 1910. — Sinéty, R. de, Recherches sur la Biologie, et l'Anatomie des Phasmes. La Cellule, XIX, 117, 1901. — Stockard, Ch. R., Habits, Reactions, and Mating Instincts of the »Walking Stick« *Aptopus Mayeri*. Carnegie Institution of Washington, CIII, 43, 1908.

VIII. Tafelerklärung.

Tafel VI.

Kolorierte Photographie in natürlicher GröÙe.

Die mit arabischen Ziffern bezeichneten Vertikalreihen beziehen sich auf 8 verschiedene Farbtypen der Stabheuschrecke *Dixippus morosus*, nämlich:

1. »braun 1«, 2. »braun 2«, 3. »braun 3«, 4. »rot (2)«,
5. »schwarz«, 6. »grün 1«, 7. »grün 2«, 8. »grün 3«.

Die mit kleinen römischen Buchstaben bezeichneten Horizontalreihen beziehen sich auf die chemische Verarbeitung der 8 Farbtypen:

- a) das Ausgangsmaterial: Imagines, Weibchen, von oben,
- b) aus den Preßsäften derselben aufgetragene »Wasserfarben«,
- c) aus dem Preßrückstande hergestellte Ätherextrakte,
- d) aus den Preßsäften gewonnenes »Filtrat I«,
- e) Melaninbildung der aus den Preßsäften gewonnenen Tyrosinasen,
- f) spätere Verfärbung der mit Tyrosinase angegangenen Tyrosinproben.

Nachschrift.

In der Umschau XXV, 492, 1921 hat A. Schmitt-Auracher eine vorläufige Mitteilung über Farbwechsel an *Dixippus* veröffentlicht. Sie scheint den uns mißglückten Versuch, durch Ausschaltung der Augen den Farbwechsel hintanzuhalten, mit positivem Erfolge ausgeführt zu haben. Die mitgeteilten Farben der Stabheuschrecken bei Haltung in verschiedenfarbiger Umgebung stimmen mit unseren und jenen der früheren Autoren überein. Hingegen vermögen wir nicht die Berechtigung ihrer nach der Heßschen These der totalen Farbenblindheit aller Insekten zugeschnittenen Schlüsse zuzugeben. Es sei vorläufig bloß an die grüne Farbe der *Dixippus* in Finsternis bei Verwendung grauer Umgebung und bei weißer erinnert, welche es ausschließt, daß die schwärende Wirkung der blauen und violetten Strahlen bloß auf der Exzeption verschiedener Intensitäten beruht.