in experimental animals¹². In addition, it has been noted that reduced levels of serum complement were observed in patients with active SLE¹³, supporting the thesis that antigen-antibody complexes which absorb complement are being formed. Experiments designed to demonstrate direct nuclear staining in the absence of serum titers or, in any case, to demonstrate circulating and/or tissue-sequestered complexes of antibody and nuclear fragments would provide an important step toward the solution of the problem.

Zusammenfassung. Es wird mit indirekter Immunofluoreszenz gezeigt, dass Leberzellkerne mit Antikörpern bedeckt werden können, wenn sie systemischem *Lupus erythromatosus*-Serum (SLE) für weniger als 2 sec ausgesetzt werden, und dass die Färbungsintensität vom Titer des Antikörpers abhängt.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das in SLE-Gewebe durch direkte Immunofluoreszenz nachgewiesene nukleare γ -Globulin hauptsächlich nukleare post-

Biopsiereaktionen widerspiegelt und weniger in vivo-Reaktionen, und dass in beiden Fällen nur abgestorbene oder nicht intakte Zellen vom Antikörper durchdrungen werden.

G. W. BARNES, M. A. SULLIVAN,
E. H. BEUTNER, and E. WITEBSKY

Departments of Pathology, Medicine, Bacteriology, and Immunology, State University of New York at Buffalo (USA), February 22, 1965.

¹² F. J. DIXON, J. J. VAZQUEZ, W. O. WEIGLE, and C. G. COCHRANE, *Am. med. Ass. Arch. Path.* **65**, 18 (1958).
¹³ W. O. WEIGLE, in *Adv. Immunol.* **7**, 283 (1961).
¹⁴ A. S. TOWNES, C. R. STUART JR., and A. G. OSLER, *Bull. Rheum. Dis.* **11**, 245 (1961).

CORRIGENDA

In *Experientia* **21**, fasc. 5, p. 290 (1965) the heading of the paper by T. KEMÉNY, GY. SIMON, and MAGDOLNA BEDŐ reads correctly as follows: *Absorption Tests on Protein-Deficient Rats. Absorption of S³⁵-Methionine and I¹³¹-Triolein*. The absorbed material in Figure 1 reads correctly: S³⁵-methionine and in Figure 2 I¹³¹-triolein.

Fig. 1. S³⁵-methionine absorption in protein-deficient rats.

Fig. 2. I¹³¹-triolein absorption in protein-deficient rats.

G. BALDRATTI, G. ARCARI, and G. K. SUCHOWSKY: Studies on a Compound Antagonistic to 5-Hydroxytryptamine. *Exper.* **21**, fasc. 7, p. 396 (1965).

The chemical compound studied was not the 1-methyl-8 β -carbobenzyloxy-aminomethyl-10 α -ergoline but the
1,6-dimethyl-8 β -carbobenzyloxy-aminomethyl-10 α -ergoline.