Berichtigung zu dem Artikel „Ein neuer Salmonella-Typ (*S. abortus canis*)“.

Von
Sven Gard.

In Tabelle 2a dieser Arbeit ist irrtümlicherweise angegeben, daß *S. odense* das O-Antigen V besitzt, während die O-Antigenstruktur bei diesem Typ in Wirklichkeit IV (XII) ist. Die in der Tabelle mitgeteilten Absorptionsversuche liefern daher keinen Beweis für die für den neuen Typ aufgestellte Antigenformel IV, V, XII. Daß jedoch diese Formel trotzdem Gültigkeit besitzt, geht aus dem Umstand hervor, daß der neue Stamm ein typhi-murium-O-Serum vollständig absättigt. Es hat sich außerdem gezeigt, was in der Arbeit nicht angeführt ist, daß ein abortus-canis-O-Serum nach Absorption mit typhi O und reading O andauernd sowohl typhi murium O als den eigenen Stamm agglutiniert. Die mitgeteilte Antigenformel dürfte daher korrekt sein.

Den in Tabelle 2a zusammengestellten Resultaten der Absorptions- und Agglutinationsversuche mit *S. odense* müssen wohl Verschiedenheiten in der Beschaffenheit des XII-Antigens bei odense, reading und typhi zugeschrieben werden.