villorrio en Gambia. Se utilizaron terneros destetos N'Dama par comparar la torta de sésamo y de semilla de algodón como fuente de proteína suplementaria durante la estación lluviosa y principio de la seca del año 1987. Se les dió a los animales 0, 40, 80 o 160 g de proteína cruda/día en éstas formas durante cuatro meses. La suplementación incrementó significativamente la tasa de crecimiento, de 169 g/día en controles a 272 y 271 g/día en aquellos que recibieron torta de sésamo y de algodón respectivamente; no hubo diferencia estadística entre los grupos suplementados.

Durante los cuatro meses de la estación seca inmediatamente después de que la suplementación fue suspendida, todos los grupos que habían sido suplementados crecieron significativamente más rápido que los controles ($P < 0.05$), indicando un efecto compensatorio en los suplementados. Durante ese período la media de crecimiento de los grupos que recibieron torta de sésamo excedió a aquella de los que habían recibido torta de algodón (217 cf. 158 g/d; $P < 0.01$). Los beneficios económicos de estos resultados fueron substanciales.

ERRATUM

Volume 23 (1991): Porcine cerebral *Trypanosoma brucei brucei*. D. N. Onah and M. Uzoukwu, pp 39–44; please note that in Materials and Methods on page 39, Ca-EDTA should read Na-EDTA. Also in Table II on page 41, Hb(mg%) should read Hb(g%).