Il valore osservato e ridotto secondo il così detto metodo originale di RUDZKI concorda con il vero, dato dalla (47), salvo il termine $2\omega^2 h$ ⁽¹⁾.

(¹) La riduzione di BOUGUER non ha nulla a che fare con lo scopo di questo scritto. Il metodo di BOUGUER è fondato sull'ipotesi che S sia superficie d'equilibrio, non per la Terra nello stato *attuale*, ma per la Terra privata senz'altro dalle masse sovrastanti su S . È, però, molto arduo predire quale valore si osserverebbe in P' (per riferirci al nostro esempio), se la massa m_i fosse portata via.

In pratica codesta riduzione è fatta grossolanamente. Nell'esempio addotto, si trova

$$(g'_{P'})_{\text{BOUGUER}} = g_P^* \left(1 + 2 \frac{h}{R} - \frac{1}{2} \frac{k}{\delta} \frac{h}{R} \right).$$

CORRECTION

By ARNOLD EMCH (Urbana - Illinois).

In a paper on *Cremona involutions and covariants connected with the Weddle surface*, which appeared to p. 101 of the present volume of this journal, the statement is made (theorem 1) that C_3 is a fivefold fundamental curve of the involution T_9 .

It should be noted that C_3 is not a proper fundamental curve of multiplicity five, but must be counted five times as a part of the intersection of F_9 with Γ_3^4 .