Themenschwerpunkt: Aktuelles in der Therapie von Verbrennungen

Aus der Klinischen Abteilung für Wiederherstellende und Plastische Chirurgie und Intensivpflege für Schwerbrandverletzte der Universitätsklinik für Chirurgie, Wien

Editorial

G. Meissl

Die Behandlung von Brandverletzten lag lange Zeit in Österreich in den Händen der Dermatologen (2). Durch die schrittweise Entwicklung der Plastischen Chirurgie in Österreich und durch das Abgehen von der konservativen hin zur frühzeitigen chirurgischen Therapie der Verbrennungswunde, ging die Behandlung brandverletzter Patienten in die Hände der Plastischen Chirurgen über. In den Jahren bis 1970 ist die Plastische Chirurgie zu den sekundären Eingriffen – Narbenkontrakturen, Aussehen – hinzugezogen worden. Später wurde bereits in der Primärbehandlung auf Funktion und Aussehen Bedacht genommen, Konzepte, die von der Plastischen Chirurgie ihren Ausgang nahmen.

1980 wurde im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien, an der I. Chirurgischen Universitätsklinik, die erste Station, ausschließlich für Brandverletzte, errichtet. Diese Station ist relativ rasch angenommen worden, so daß nach wenigen Jahren der Anlaufzeit durchschnittlich 110 Patienten im Jahr mit ausgedehnten Verbrennungen behandelt wurden.

Durch die Zusammenarbeit von Plastischen Chirurgen, Anästhesisten und Chemotherapeuten konnte die Effektivität dieser Station auf ein hohes Niveau gebracht werden. Simultan hierzu gelang es durch die intensive Kooperation mit der Universitäts-Kinderklinik, die Versorgung brandverletzter Kinder zu steigern und wesentlich zu verbessern.

Im Herbst 1993 wurde im Neuen Allgemeinen Krankenhaus eine Intensivpflegestation für Schwerbrandverletzte eröffnet. Diese Station beinhaltet alle Möglichkeiten, einschließlich eines direkt eingegliederten Operationssaales, für eine moderne und effektive Verbrennungsbehandlung.

Durch die kontinuierliche Fortbildung ist es gelungen, bereits am Unfallort im Rahmen der Ersten Hilfe auf die spezifischen Notwendigkeiten bei Brandverletzten einzugehen, so daß heute Verzögerungen im Therapiebeginn nur mehr ausnahmsweise und selten sind.

Die Schockbehandlung ist im wesentlichen standardisiert, und heute wird kein Patient mehr im Schock verloren. Trotzdem steht die Resusitation noch immer in Diskussion, da der Erfolg und Effekt für den weiteren Verlauf wesentlich ist, sowohl im Hinblick auf die sogenannte „Verbrennungskrankheit“ als auch für die lokalen Wundverhältnisse (1).

Das Inhalationstrauma, zumeist hervorgerufen durch toxische Gase, weniger oft durch Hitze selbst, ist in der Prognose und in der Behandlung ein sehr gravierender Faktor und führt, trotz Einsatz aller modernen Beatmungsmöglichkeiten, eventuell auch durch extrakorporalen Membranoxygenierung zum Tode (4).

In der Behandlung der Verbrennungswunde gibt es weltweit Einigkeit. Die frühzeitige Entfernung des zugrundegegangenen Gewebes ist heute Standard und hat wesentlich zur Verbesserung der Prognose beigetragen (5). Durch diese frühzeitige Exzision der Nekrosen ist man bestrebt, die Gefahr einer Sepsis, ausgehend von der Verbrennungswunde, zu minimieren. Diese Exzision wird tangential (6) und auch epifaszial durchgeführt. Mit ersterem gelingt es, ästhetisch und funktionell bessere Ergebnisse zu erzielen, da wichtige Strukturen der Haut erhalten werden. Bei tieferreichender Schädigung der Haut ist dieses Verfahren vielfach

nicht mehr sinnvoll. In der Verfahrenswahl der Deckung der oft sehr großen Areale gibt es eine beträchtliche Vielfalt. Es wird ständig an der Entwicklung neuer Verfahren und Möglichkeiten geforscht. Eine interimistische Deckung der Wunden durch Hautsubstitute bewirkt eine Reduzierung des Energieverbrauchs und die Gefahr der Keimbeseidlung von außen. Autologe Haut in den verschiedensten Varianten zum Verschluß der Wunde soll so rasch wie möglich das Integument wiederherstellen. Aufgrund der Ausdehnung ist dieses Verfahren oft nur sehr langsam möglich. Neuere Entwicklungen wie Züchtung von Haut (Keratinocyten) und künstliche Dermis helfen, einen raschen Wundverschluß zu erzielen.

Durch den enormen Energieverbrauch dieser Patienten ist der Metabolismus um ein Vielfaches gesteigert und bewirkt ein kataboles Zustandsbild mit allen damit einhergehenden negativen Auswirkungen, wie verminderte Immunität, erhöhte Infektanfälligkeit und damit Gefahr der Sepsis, verzögerte Wundheilung, um nur einige zu nennen. Dadurch kommt heute vor allem der enteralen Ernährung in der Behandlung von Schwerbrandverletzten ein sehr hoher Stellenwert zu (7). Trotzdem ist es sehr häufig nicht möglich, den katabolen Zustand des Patienten zu durchbrechen. In neuerer Zeit werden Ergebnisse in der Forschung mit Wachstumshormonen bereits in die Therapie mit eingesetzt (3).

Es sind in den letzten 15 Jahren beträchtliche Fortschritte in der Behandlung der Brandverletzten gemacht worden, man ist aber noch weit entfernt, eine optimale Therapieform zu besitzen, um den Patienten das Überleben in einem funktionell ästhetischen und dadurch auch psychisch optimalen Zustand zu garantieren.

Literatur

- (1) Arturson G: Pathophysiology of the burn wound and pharmacological treatment. *Burns* 1966;22:255.
- (2) Diem E, Wittels W: Zum gegenwärtigen Stand der Verbrennungsbehandlung. *Allgemein therapeutische Gesichtspunkte*. *Wien klin Wschr* 1975;87:621.
- (3) Fleming RYD, Rutan RI, Jahoor F, Barrow RE, Wolfse RR, Herndon DN: Effect of recombinant human growth hormone on catabolic hormones and free fatty acids following thermal injury. *J Trauma* 1992;32:698.
- (4) Goretsky MJ, Greenhalgh DG, Warden GD, Ryckman FG, Warner BW: The use of extracorporeal life support in pediatric burn patients with respiratory failure. *J Pediatr Surg* 1995;30:620.
- (5) Gray DT, Pine RW, Harnar TI, Marvin JA, Engrav H, Heimbach DM: Early surgical excision versus conventional therapy in patients with 20 to 40 percent burns: A comparative study. *Am J Surg* 1982;144:76.
- (6) Janzekovic Z: A new concept in the early excision and immediate grafting of burns. *J Trauma* 1970;10:1103.
- (7) Wolfe RR: Caloric requirements of the burned patients. *J Trauma* 1981;21:712.

Kongreßankündigung

1. Interdisziplinäres Hepatologisches Wintertreffen

Termin und Ort: 21. bis 28. März 1998 – Obergurgl.

Hauptthema: Hepatozelluläres Karzinom.

Kongreßsekretariat: Prof. Dr. W. Vogel, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Tel. +43/ 512/ 504 DW 4300, Fax DW 4052.

Korrespondenzanschrift: Prof. Dr. G. Meissl, Klinische Abteilung für Wiederherstellende und Plastische Chirurgie und Intensivpflege für Schwerbrandverletzte, Universitätsklinik für Chirurgie, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien.