- MANNERS, J. G., – 1950. Studies on the physiologic specialization of yellow rust (*Puccinia glumarum*) in Great Britain. *Ann. Appl. Biol.* 37: 187–214.
- NOLL, A., – 1955. Auftreten und Verbreitung physiologischer Rassen des Weizengelbrostes (*Puccinia glumarum*) in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1946–1952. *Nachr. bl. Deuts. Pfl.schutzd. (Br)*: 7: 10–13.
- OORT, A. J. P., – 1949. Distribution and interrelationship of physiologic races of *Puccinia glumarum*. *Proc. 4th Int. Congr. Microbiology, Copenhagen* p. 432–433.
- STRAIB, W., – 1935. Auftreten und Verbreitung biologischer Rassen des Gelbrostes (*Puccinia glumarum* (Schm.) Erikss. et Henn.) im Jahre 1934. *Arb. Biol. Reichsanst.* 21: 455–466.
- STRAIB, W., – 1937. Untersuchungen über das Vorkommen physiologischer Rassen des Gelbrostes (*Puccinia glumarum*) in den Jahren 1935/'36 und über die Aggressivität einiger neuer Formen auf Getreide und Gräsern. *Arb. Biol. Reichsanst.* 22: 91–119.
- STRAIB, W., – 1939. Weiterer Beitrag zur Frage der Spezialisierung von *Puccinia glumarum* (Schm.) Erikss. et Henn.. *Arb. Biol. Reichsanst.* 22: 571–579.
- STRAIB, W., – 1941. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Spezialisierung der Getreideroste und des Leinroste. *Arb. Biol. Abt. Reichsanst.* 23: 233–263.

CORRIGENDA:

I. W. BUDDENHAGEN: Various aspects of *Phytophthora cactorum* collar-rot of apple trees in the Netherlands.
T. Pl. ziekten 61(1955): 122-129.

s.v.p. toevoegen op (*please add on*) p. 126.

Fig. 1. Van links naar rechts resp. bij: 5°, 10°, 15°, 20°, 25° en 30°C.
From left to right resp. at: 5°, 10°, 15°, 20°, 25° and 30°C.

Fig. 2. Van links naar recht resp. bij: 5°, 10°, 15°, 20° en 25°C.
From left to right resp. at: 5°, 10°, 15°, 20°, and 25° C.