glesi alla Società Reale nella seduta del 17 Giugno, pongono in una evidenza nuova e maggiore di quanta se ne avesse per lo addietro, l'importanza di quel primo stadio della glucogenia animale che consiste nella produzione di una specie di sostanza amiloide. La scoperta fatta dal Bernard di siffatta sostanza nel tessuto epatico, fu il primo annunzio che si avesse di quella prima fase della produzione del glucosio; ora il Pavy pone in chiaro che la genesi della epatina, come egli la chiama, non è cosa tanto istantaneamente e direttamente congiunta con la successiva trasformazione in glucosio, quanto da molti si pensa: ma che anzi costituisce rispetto al fegato una operazione speciale, che lo rende capace di fare da magazzino, or più ed or meno capace, per i principii alimentari non azotati; mentre poi sappiamo tuttora così poco delle ulteriori metamorfosi di quella sostanza, della quantità e della sede normale della produzione glucosica, che molte delle leggi di questa sono per noi tuttora inesplorabili.

C. S.

Pisa 15 febbrajo 1859.

METODO PER LA RICERCA DELL' ACIDO URICO IN SOLUZIONE;
DI STADELER.

Il liquido si precipita coll'acetato di piombo basico, ed il precipitato, che consiste in urato di piombo, si decompone coll'idrogeno solforato, e quindi il liquido separato dal solfuro di piombo per filtrazione, depone l'acido urico cristallizzato in prismi esagonali.

(*Segue la continuazione dell' articolo — Nuova Teoria degli Strumenti Ottici — del Prof. O. F. Mossotti*).