NOTA SULL' ACIDO CAMFOLICO; BARTH.

(*Annalen der Chem.* 1858).

L'acido camfólico $C^{10}H^{18}O^2$ (1) parrebbe per la sua composizione omologo al crotonico, all'angelico ed all'oleico; non ostante esso non ha una costituzione simile a quest'ultimi perchè colla potassa idrata non si scinde in acido acetico ed un omologo.

SULL' AMIDURO DI SODIO; BEILSTEIN E GEUTER.

(*Annalen der Chemie und Pharm.* Ottobre 1858).

Beilstein e Geuther preparano l'amiduro di sodio AzH^2Na per l'azione dell'ammoniaca perfettamente secca sopra il sodio fuso prima in una corrente d'idrogeno secco, l'ottengono in una massa cristallina verde oliva.

AzH^2Na scaldato in una corrente di ossido di carbonio dà cianuro sodico, soda idrata e si sviluppa ammoniaca. La reazione può interpretarsi così:

È un fatto di più per confermare che il cianogeno si forma sempre per l'azione di CO sopra AzH^2 . Difatto

Il solfuro di carbonio reagisce ad un dolce calore sull'a-

(1) $H=1$, $C=12$, $O=16$ Molecola dell'acqua $=H^2O$.(2) $H=1$, $C=12$, $O=16$.