BUCHBESPRECHUNGEN

AL-KITTANI, M. M.: Äsungsbiologische Untersuchungen in drei österreichischen Rehwildrevieren als eine Grundlage für die Ableitung tragbarer Wilddichten. Dissertationen der Hochschule für Bodenkultur in Wien 5. Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien, 1975. 101 S., 32 Tab., 19 Abb. 105,— öS.

Diese Untersuchungen hatten zum Ziel, in drei standörtlich verschiedenen österreichischen Rehwildrevieren Äsungseinheiten und deren flächenmäßige Verteilung zu ermitteln, das Äsungsangebot und die Aufnahme von Äsung durch Rehwild im Sommer und Winter nach Qualität und Quantität zu erfassen, die Auswirkungen des Verbisses von Baumarten auf die Jungbestandsentwicklung zu klären, tragbare Wilddichten abzuleiten, die Äsungseinheiten und die Schadensauswirkung des Verbisses in den drei Revieren als Basis für eine standorts- und bestandsangepasste Wildstandsregulierung zu vergleichen. Dazu wurden die Vegetation auf 198 Probeflächen je einmal im Sommer und Winter nach vegetationskundlichen Methoden aufgenommen und der Verbißgrad der Arten angesprochen, dabei landwirtschaftliche Nutzflächen aber nicht repräsentativ erfaßt. Daraus wurden 28 Äsungseinheiten gebildet und kartiert, eine Größe für das Äsungsangebot ermittelt, ein Beliebtheitsgrad der einzelnen Arten und die Verbißmenge errechnet, schließlich eine Bonitierung der Äsungseinheiten vorgenommen, für jedes Revier die durchschnittliche Äsungsbonität für Sommer und Winter bestimmt, biotisch und waldbaulich tragbare Wilddichten angeschätzt — die unter den bisher angesetzten Werten liegen — und ein äsungsbiologischer Vergleich der drei Untersuchungsreviere durchgeführt. Als Mängel werden genannt, daß die angewandten Methoden sehr zeitaufwendig sind und die Wilddichteermittlung nur auf Schätzungen beruht.

Diese Arbeit versucht also, Kriterien für tragbare Wilddichten aus einer Analyse der Vegetations- und Verbißverhältnisse mit Methoden, die aus vegetationskundlichen Arbeitsweisen entwickelt sind, abzuleiten. Damit werden — weitere — Möglichkeiten aufgezeigt, der Lösung des komplexen Problems tragbarer Wilddichten durch Untersuchungen des Lebensraums näher zu kommen. Nicht zu übersehen sind einige Ungereimtheiten und formale Mängel, z. B. zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis ohne Seitenangaben und am Ende ein Literaturverzeichnis, das nicht alle zitierten Quellen enthält und nicht immer alphabetisch geordnet ist.

R. FELDNER

VYSKOT, M.: Tree story biomass in lowland forests in South Moravia. Praha: Academia CSAV 1976. 166 S. Tab.-Anhang. 45 Kr.

Das Internationale Biologische Programm (IBP) zeitigt seine Ergebnisse. Nachdem ULRICH, MAYER und HELLER im Heft Nr. 30 (tatsächlich handelt es sich um ein Buch von 459 Seiten Umfang) der Göttinger Bodenkundlichen Berichte eine erste vorläufige Zusammenstellung der wichtigsten Resultate von Erhebungen auf 56 produktionsökologisch genau erfaßten Waldbeständen der gemäßigten Zone veröffentlicht haben, erscheint jetzt eine sehr eingehende Studie über einen ebenfalls im Rahmen des IBP untersuchten Laubwald in Mähren. Der Autor hat für seine Arbeiten einen Auenwald ausgewählt, der hauptsächlich aus Stieleiche, Winterlinde, Esche, Ulme und Hainbuche zusammengesetzt ist, eine Hartholzaue also.

Die außerordentlich gut dokumentierte Analyse des 90jährigen Untersuchungsbestandes basiert vor allem auf der vollständigen — Wurzel, Stamm und Krone — Erfassung von 15 Einzelbäumen: 5 davon der herrschenden Schicht angehörend, je weitere 5 der mitherrschenden und beherrschten. Vom Umfang der damit verbundenen Arbeiten gewinnt man einen Eindruck, wenn man hört, daß der stärkste der ausgegrabenen Bäume eine Eiche von 6 fm Stamminhalt war.

Die Befunde der Untersuchung sind so überraschend und wichtig, daß man versucht ist, sie hier im einzelnen darzustellen und damit den Rahmen einer Rezension zu sprengen. Immerhin sei so viel gesagt, daß der Auwald ein Biovolumen von 672 m³/ha akkumuliert hatte, davon entfielen knapp 15 % auf die Wurzeln, 16 % auf die Kronen und der Hauptteil von 69 % auf die Stämme. Das alles entspricht einer Biomasse von 360 t/ha, und der durchschnittliche jährliche Zuwachs an Trockenmasse erreicht den beachtlichen Wert von fast 18 t/ha/a.

Diese wenigen Angaben mögen genügen, um die Neugier zu wecken. Die Schrift des Brünner Waldbau-Professors VYSKOT stellt einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Leistungsfähigkeit unserer Wälder dar; sie gehört in die Bibliothek jedes forstwissenschaftlichen, ökologischen und vegetationskundlichen Instituts.

P. BURSCHHEL