SUMMARY

Micarea umbrosa VÉZDA et V. WIRTH sp. n., independently found by both the authors in Europe is described. It is closely related to *Micarea bauschiana* (KÖRB.) V. WIRTH et VÉZDA comb. n. (= *Biatora bauschiana* KÖRB.). A key (in latin) to the better known European species of the genus *Micarea* is presented; the following new combinations are necessary: *Micarea bacidiella* (VAIN.) VÉZDA (= *Lecidea denigrata* var. *bacidiella* VAIN.), *M. hemipoliella* (NYL.) VÉZDA (= *Lecidea hemipoliella* NYL.), *M. leprosula* (TH. FR.) VÉZDA (= *Bilimbia milliaria* * *leprosula* TH. FR.), *M. minuscula* (ANZI) VÉZDA (= *Bacidia minuscula* ANZI), *M. polioides* (NYL.) VÉZDA (= *Lecidea polioides* NYL.), *M. subleprosula* (VÉZDA) VÉZDA (= *Bacidia subleprosula* VÉZDA) and *M. sylvicola* (FLOT.) VÉZDA et V. WIRTH (*Lecidea sylvicola* FLOT.).

LITERATUR

- FRIES, TH. (1871): Lichenographia scandinavica etc. I. — Upsaliae.
HEDLUND, T. (1892): Kritische Bemerkungen über einige Arten der Flechtengattung *Lecanora* (ACH.), *Lecidea* (ACH.) und *Micarea* (FR.) — Bih. Koenig. Svensk Vetensk.-Akad. Handl. 18, Afd. 3, Stockholm, No. 3: 1—104.
JAMES, P. W. (1965): A new check-list of British lichens. — The Lichenologist, London, 3: 95—153.
NYLANDER, W. (1868): Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. Continuatio nona. — Flora, Regensburg, 51: 473—480.
NYLANDER, W. (1880): Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. Continuatio quarta et tricesima. — Flora, Regensburg, 63: 387—394.
VÉZDA, A. (1970): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 307—337.
WIRTH, V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. — Dissert. Bot., 17, Lehre.

Eingegangen am 6. Dezember 1974

Tafel 7

Erratum

Im Artikel VÉZDA A.: Foliikole Flechten aus Tanzania (Folia Geobot. Phytotax., Praha 10: 383—432, 1975) sind die Texte unter den Abbildungen 6 (Seite 401) und 7 (Seite 403) verwechselt: Abb. 6 lies: 9. *Porinula tanzanica*..., Abb. 7 lies: 10. *Pocsia marattiae*...