Es seien gleich angeschlossen die Ziffern für Suicid: auf die nach ihrem 10. Jahr Verstorbenen bezogen 5,8%, auf alle über ihr 10. Jahr hinaus Beobachteten bezogen 0,84% (1,0% bzw. 0,4%); und die Ziffer für Tuberkulosesterblichkeit: unter allen zwischen dem 11. und 50. Jahr Verstorbenen nach Abzug der Geisteskranken und gewaltsamen Todes Verstorbenen 29,3% (22,3%).

Es liegen bei uns also fast alle Ziffern über denen des Vergleichsmaterials; sie erreichen in einigen Fällen die Ziffern der *Bruggerschen* Durchschnittsbevölkerung aus Basel-Stadt (dort z. B. Schizophreniehäufigkeit: 1,58%, Suicidhäufigkeit: 3,1% bzw. 0,87%).

Die Höhe unserer Ziffern kann zurückzuführen sein 1. darauf, daß wir es mit einer Großstadtbevölkerung zu tun haben; 2. darauf, daß uns möglicherweise eine genauere Erforschung unserer Probanden gelang; 3. darauf, daß unsere Probanden keine Auswahl nach erreichtem Lebensalter usw. darstellen.

Berichtigung.

In unserer gemeinsam mit Herrn *E. Schill* verfaßten Mitteilung „Über Alexie und Agnosie“ in Bd. 139, H. 2, S. 231 ist der Passus in der von unten gerechneten Zeile 18 „kommt durch die Carotis“ mit den Worten „und die Basilaris“ zu ergänzen.

Ranschburg.