Pathologica (Genova) **5**, 707—710 (1913). — ²² *Walter*, Zur Histologie und Physiologie der menschlichen Zirbeldrüse. *Z. Neur.* **74**, H. 3, 314—330 (1922). Weitere Untersuchungen zur Pathologie und Physiologie der Zirbeldrüse. *Ibid.* **83**, 411—463.

Nachtrag.

Während der Korrektur des gegenwärtigen Aufsatzes erscheint in dieser Zeitschrift (Bd. 121, H. 3/4, S. 423/428) eine Schrift von eigenem Interesse, in welcher *W. Kolmer* einige typische Ganglienzellen als konstanten Bestandteil der Affenzirbel beschreibt. Das Aussehen und die Merkmale dieser Ganglienzellen, die *Kolmer* beschrieben und in Abb. 3 (S. 427) auf Mikrophotogramm überzeichnet hat, hatte ich schon in meinem vorigen Aufsatz (16) beschrieben und mikrophotographisch in Abb. 8 (s. 209) dargestellt. Im obengenannten Aufsatz erinnerte ich, daß in etwa hundert erforschten menschlichen Zirbeln, mir nur einmal eine typische Ganglienzelle zu sehen gelang (S. 208). Nach der Veröffentlichung dieser Untersuchungen erforschte ich, teils in Serienschnitten, teils mit Hilfe von speziellen histologischen Methoden, noch sehr zahlreiche menschliche Zirbeln, sowie zahlreiche Zirbeln von Säugetieren verschiedener Arten, und glaube, in allen diesen Zirbeln die Anwesenheit von echten Ganglienzellen ausschließen zu können. Leider enthielt meine Sammlung nur 2 Affenexemplare (*Hapale jacchus* und Schimpanse); auch bei diesen 2 Tieren war keine Ganglienzelle in der Epiphyse vorhanden. Außerdem, die von *Kolmer* untersuchten Nagerzirbeln „ließen keine entsprechenden Elemente erkennen“ (S. 427). Der konstante Befund von Ganglienzellen im Zirbelparenchym betrifft also bis jetzt nur drei einzelne Arten (*Macacus rhesus*, *M. sinicus*, *Cynocephalus papio*). Übrigens bleibt das von mir im gegenwärtigen Aufsatz beschriebene *Ganglion conari* vom *Kolmerschen* Befund unabhängig.