mittent suxamethonium administration during halothane anaesthesia. *Acta Anaesthesiol. Scand* 1967; 11: 333-40.

- 22 Tammisto R, Brander P, Airaksinen M, Tommola V, Lintola J. Strabismus as a possible sign of latent muscular disease predisposing to suxamethonium-induced muscular injury. *Ann Clin Res* 1970; 2: 126-30.

Résumé

La rhabdomyolyse causée par l'anesthésie générale (AIR) est une complication rare mais sérieuse. On a constaté un tel cas chez un garçon de trois ans, en bonne santé mais ayant des antécédents familiaux de dystrophie musculaire, type Duchenne. Après le cours normal de l'anesthésie générale incluant l'usage de la succinylcholine, l'enfant développa une myoglobulinurie qui provoqua une insuffisance rénale. Heureusement, la fonction rénale reprit son cours normal suite à un traitement conservateur. Se basant sur les rapports d'autres cas semblables il est évident qu'on doit éviter l'administration de succinylcholine chez les enfants atteints de myopathie ou prédisposés à la myopathie.

Errata

Re: Strunin L, Davies JM. The liver and anaesthesia. 1983; 30: 208-17 (March).

The sentence (page 209) "Oxygen consumption is about 1 ml per gram of liver tissue per minute."

should read

"Liver blood flow is about 1 ml per gram of liver tissue per minute."

Self-assessment question Number 5, Item 3 (page 218)

should read

"Liver blood flow = about 1 ml/gm/minute."

The correct answer remains as "B" (Items 1 and 3 correct)