Buchbesprechung

N. Becker, J. Wahrendorf

Krebsatlas der Bundesrepublik Deutschland 1981-1990

Atlas of Cancer Mortality in the Federal Republic of Germany 1981-1990

3., völlig neu bearbeitete Aufl. 1997. 736 S., 117 Abb., 80 Tab., ISBN 3-54062914-9, DM 178,- (Springer, Berlin-Heidelberg-New York)

Verlässliche Angaben über die Inzidenz verschiedener Krebsarten existieren bis heute nur für wenige Regionen, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder. Auch in Deutschland fehlt eine zuverlässige flächendeckende Erfassung der Tumorerkrankungen, wengleich durch das 1995 verabschiedete Krebsregistergesetz eine Verbesserung der Registrierung angestrebt wird. Epidemiologische Untersuchungen zum Krebsvorkommen in Deutschland müssen sich daher gegenwärtig noch an der amtlichen Todesursachenstatistik orientieren, aus der aber nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Krebsinzidenz möglich sind.

Der jetzt in dritter, völlig neu bearbeiteter Auflage von N. Becker und J. Wahrendorf herausgegebene „Krebsatlas der Bundesrepublik Deutschland“ beschreibt die Krebssterblichkeit in Deutschland seit Beginn der 50er Jahre bis 1995. Im Vergleich zur zweiten Auflage von 1984 sind in der aktuellen Version auch die Daten der ehemaligen DDR enthalten, so daß erstmals eine umfassende Darstellung der „Krebslandschaft“ für Gesamtdeutschland möglich wurde.

Das 736 Seiten umfassende Werk gliedert sich in vier große Teile. Auf den ersten 33 Seiten werden Datenquellen und Darstellungsmethoden des statistischen Zahlenmaterials beschrieben. Im zweiten Teil wird ein Überblick über die Krebsmortalität in Deutschland gegeben. Es folgen 24 Einzelkapitel, in denen detailliert die Mortalitätsdaten für die häufigsten Krebsarten, getrennt nach geographischen Regionen, Geschlecht und zeitlicher Entwicklung, dargestellt sind. Die kartographische Präsentation der Mortalitätsdaten für alle Krebserkrankungen zusammen sowie die verschiedenen Tumorentitäten bilden das Herzstück des Werkes. Die Einzelkapitel sind einheitlich strukturiert und schließen auch kommentierende Textteile ein, in denen unter anderem auch ein Überblick über gesicherte und vermutete Risikofaktoren von Krebserkrankungen gegeben wird. Im vierten Abschnitt („Schlußbemerkungen“) werden Möglichkeiten der primären und sekundären Prävention erläutert, mit denen der gegenwärtige Trend der Rückläufigkeit der Krebssterblichkeit in Deutschland weiter unterstützt werden könnte. Das abschließende Literaturverzeichnis beschränkt sich auf essentielle Referenzen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Zusammenfassend stellt der Krebsatlas eine wertvolle Informationsquelle für alle mit dem Krebsproblem konfrontierten Berufsgruppen dar. Neben Epidemiologen, Grundlagenwissenschaftlern und Ärzten sollten sich vor allem auch Gesundheitsökonom und Politiker von dem ausgezeichneten Buch angesprochen fühlen, das weitreichende Einblicke in die im kommenden Jahrhundert auf uns zukommenden Tumorerkrankungen ermöglicht. Der angesichts der großzügigen Ausstattung des Buches mit 177 mehrfarbigen Abbildungen, umfangreichem Tabellarium, Großformat und Leineneinband günstige Preis von DM 178,- sollte eine weite Verbreitung des Buches begünstigen.

Unnötig und unübersichtlich ist die doppelte Präsentation der Textteile in deutscher und englischer Sprache, die aus den vorangegangenen Ausgaben des Buches übernommen wurde, angesichts zunehmender Globalisierung der Wissenschaften und verbesserter Sprachkenntnisse der Leserschaft aber entbehrlich erscheint.

C. Aul, Düsseldorf

Erratum

In der Arbeit von C. Rübe et al.: *Phase-I Trial of Paclitaxel and Concurrent Radiotherapy in the Treatment of Malignant Gliomas. Preliminary Clinical and Pharmacokinetical Results. Strahlenther Onkol 1998;174;Suppl 1:2-5* wurde auf Seite 4 versehentlich statt Abbildung 2 die Abbildung 1 zweimal abgebildet. Wir bringen beide Abbildungen noch einmal und bitten um Entschuldigung.

Figure 1. Plasma concentration vs time: curve of a typical patient receiving 20 mg/m² paclitaxel as a 1 hour infusion.

Abbildung 1. Plasmakonzentration vs. Zeit: Kurvenverlauf nach 20 mg/m² Paclitaxel als Ein-Stunden-Infusion.

Figure 2. Individual urinary excretion of paclitaxel in 13 patients.

Abbildung 2. Individuelle Urinausscheidung von Paclitaxel (13 Patienten).