den vorliegenden Messungen nach der klassischen Formel eine Resonanzwellenlänge zwischen 500 und 400 Å, während die intensivste Absorptionslinie bei 584 Å und die übrigen zwischen 600 und 500 Å liegen¹⁾. Ähnlich ist es bei den anderen Edelgasen und bei Quecksilber.

Streng genommen hätte man natürlich die genannten Atome als Probleme von mehreren Freiheitsgraden zu behandeln und die obigen Formeln dementsprechend zu verallgemeinern²⁾; darauf soll aber hier nicht eingegangen werden. Bei Gasen mit einfachen Absorptionsspektren dürfte die Formel (15) vorläufig ausreichen.

München, Institut f. theor. Physik, August 1924.

¹⁾ Th. Lyman, Science **56**, 167, 1922.

²⁾ Hinweise, wie eine solche Verallgemeinerung geschehen kann, finden sich in der S. 308 zitierten Arbeit des Verfassers. Vielleicht darf man bei negativen Quantensprüngen ($k < 0$), wie sie z. B. nach Bohr in den Hauptabsorptionslinien von Zn, Cd, Hg vorkommen, Komplikationen erwarten, wie Vertauschung von normaler und anormaler Dispersion in der Nähe der Absorptionslinien. Die Dispersion dieser Dämpfe im Ultravioletten scheint bisher nicht gemessen zu sein.

Berichtigung

zu der Arbeit: R. Mecke, Zur Systematik der Bandenspektren¹⁾.

Die Gleichungen (18), S. 271, sind, wie folgt, zu berichtigen:

$$\left. \begin{aligned} F_1(m) &= F_{+2}(K) = F_{+2}(J-2) \sim E_1 + b(\sqrt{K^2 + \sigma^2} - 1)^2 \\ F'_1(m) &= F_{-2}(K) = F_{-2}(J+2) \sim E'_1 + b(\sqrt{K^2 + \sigma^2} - 1)^2 \\ F_2(m) &= F_{+1}(K) = F_{+1}(J-1) \sim E_2 + bK^2 \\ F'_2(m) &= F_{-1}(K) = F_{-1}(J+1) \sim E'_2 + bK^2 \\ F_3(m) &= F_0(K) = F_0(J) \sim E_3 + b(\sqrt{K^2 + \sigma^2} + 1)^2 \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

Ferner heißt der Schlußsatz der Arbeit (S. 277): In der vorsichtigen Anwendung desselben hätten wir dann ein weiteres Hilfsmittel, die Träger eines Bandenspektrums zu ermitteln.

¹⁾ ZS. f. Phys. **28**, 261—277, 1924.