Auflösung

Akrozyanose

© Dieter Leithäuser

Abbildung: Die Akrozyanose tritt meist an Fingern und Füßen auf. An den Ohren ist sie sehr selten.

Die Ursache dieser auffälligen Verfärbung ist hier nicht in einem Trauma durch Brillenbügel, einer Selbstmanipulation oder einer Gerinnungsstörung zu suchen. Dieses Krankheitsbild gehört in den Formenkreis einer vaskulären Akrozyanose, wahrscheinlich bei familiärer Disposition.

Klinik

Bei der Akrozyanose handelt es sich, wie die Bezeichnung schon sagt, um eine blaurote Verfärbung akraler Hautabschnitte. Meist tritt sie an Händen und Füßen auf, selten auch an Ohren und Nase.

Häufig betroffen sind junge Frauen mit niedrigem Blutdruck. Im Unterschied zum klassischen Raynaud-Syndrom treten jedoch keine anfallsartigen Gefäßspasmen auf.

Diagnose

Typisch ist das Irisblendenphänomen: Die livide Hautverfärbung lässt sich mit dem Finger wegdrücken. Der entstehende zentrale ischämische Herd färbt sich nach dem Loslassen nur langsam wieder vom Rand her zyanotisch ein. Bei normalem Gefäßtonus würde sich die Haut sowohl vom Zentrum als auch vom Rand her röten.

Sichern lässt sich die Diagnose per Kapillarmikroskopie. Darin findet man sehr weite und geschlängelte Kapillaren, eine

veno-kapilläre Stase sowie vermehrt und stärker ausgebildete arterio-venöse Anastomosen.

Therapie

Außer einer vorsichtigen lokalen rückfettenden Hauttherapie sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Dr. med. Dieter Leithäuser
Warburg