Lang wirksamer GLP-1-Rezeptoragonist Antidiabetikum mit Herzschuttfaktor?

■ Typ-2-Diabetiker sterben nicht am hohen Blutzucker, sondern an makrovaskulären Ereignissen, die das Resultat vieler metabolischer Risikofaktoren sind. Daher macht es Sinn, eine Therapie zu wählen, die möglichst an allen Punkten ansetzt wie der GLP-1-Rezeptoragonist Exenatide. Und in naher Zukunft auch mit nur einer Injektion pro Woche.

Drei Viertel der Todesursachen bei Typ-2-Diabetikern sind kardiovaskuläre Komplikationen, darauf wies Prof. Thomas Forst aus Mainz hin. Ausgehend vom viszeralen Fettgewebe der meist adipösen Patienten entsteht eine metabolische Dysbalance, die über Insulinresistenz, vaskuläre Entzündung, Dyslipidämie und Hypertonie zu Atherosklerose führt. Wichtiger als bisher gedacht ist hierbei das Proinsulin, das bei Betazellerschöpfung vermehrt im Blut auftaucht. Wie Forst gesagt hat, fördert es Insulinresistenz wie Hypertonie und wirkt atherogen. „Proinsulin ist ein unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor!“ Umso wichtiger sei es, mit Therapeutika zu arbeiten, die die Betazellen schonen wie Exenatide (Byetta®).

Allerdings kann der Wirkstoff noch mehr, wie sich in dem umfassenden Studienprogramm DURATION mit der einmal wöchentlichen Darreichungsform herausgestellt hat. In den DURATION-Studien 1 bis 5, die bereits abgeschlossen sind und zum Teil kürzlich publiziert wurden, zeigte Exenatide, dass es bei HbA_{1c}- und Gewichtsreduzierung allen oralen Antidiabetika überlegen ist und auch den Vergleich mit Insulingargin nicht zu scheuen braucht. Zusätzlich punktet es mit einer relevanten Blutdrucksenkung. Betrachtet man in einer Subgruppenanalyse von DURATION 2 Patienten mit Hypertonie, so lag die sy-

stolische Druckreduktion bei 11 mmHg. „Das ist klinisch relevant und mit manchen Antihypertensiva zu vergleichen“, so Forst. GLP-1-Rezeptoren sind auch im Myokard, Endokard und Endothel zu finden. Im Endothel stimuliert, kommt es über NO-Freisetzung zur Vasodilatation und antiatherogenen Effekten. Es sei auch belegt, dass die Aktivierung der Rezeptoren im Myokard positiv inotrop wirkt. Forst: „Das ist interessant, da Diabetiker oft latent herzinsuffizient sind.“

Nun müssen Endpunktstudien klären, ob diese pleiotropen Effekte positiv auf die kardiovaskuläre Ereignisrate wirken. In der Outcomestudie EXSCEL wird dies bis zum Jahr 2016 bei etwa 9500 Typ-2-Diabetikern mit der einmal wöchentlichen Darreichung von Exenatide geprüft. Für diese neue Galenik ist eine Mikrosphärentechnologie entwickelt worden. Die subkutan zu injizierenden Mikrosphären bestehen aus einem Polymer, das traditionell für resorbierbares Nahtmaterial verwendet wird. Daraus wird der Wirkstoff kontinuierlich freigesetzt, wobei das Polymer völlig zu CO₂ und H₂O abgebaut werde, so Forst. Nach der zweiten Therapiwoche wird der Wirkspiegel, nach 10–12 Wochen ein Steady State erreicht. Nach 8–10 Wochen sind die Mikrosphären aufgelöst. Mit diesem neuen Präparat, das voraussichtlich den Namen Bydureon® tragen soll, wird ein gleichmäßiges, lang anhaltendes Wirkprofil erzeugt. Die Zulassung in Europa ist beantragt und wird für 2011 erwartet. Daten belegen, dass der nächtliche und der Nüchternblutzucker damit besonders gut reguliert werden, die zweimal tägliche Galenik ist postprandial effektiver. spa

Redaktionsgespräch am 2.11.2010 in München, Veranstalter: Lilly

Prof. Thomas Forst,
Institut für klinische
Forschung und Ent-
wicklung (IKFE), Mainz

Kurz notiert

Gliclazid in neuer Darreichung

Servier Deutschland GmbH bietet seit dem 15.12.2010 das neue orale Antidiabetikum Diamicon UNO® 60 mg an. Die neue Darreichung als Matrixtablette mit Bruchrille enthält 60 mg des betazellselektiven Sulfonylharnstoffs Gliclazid. Wie das Unternehmen mitteilt, bleiben Indikation und Anwendung einmal täglich. Der Vertrieb des Vorgängerpräparates Diamicon UNO® 30 mg (30 mg Gliclazid) wurde eingestellt. Eine Umstellung von Diamicon UNO® 30 mg auf das neue mit 60 mg sollte durch den Arzt unter Blutzuckerkontrolle im Verhältnis 1 Tablette Diamicon UNO® 60 mg ersetzt 2 Tabletten mit 30 mg erfolgen, wobei die gesamte Tagesdosis von Diamicon UNO® 60 mg einmal täglich morgens zum Frühstück eingenommen wird. spa

Insulingabe in halben Schritten

Mit dem neuen BerliPen® Precision gibt es nun einen Insulinpen speziell für insulinpflichtige Diabetiker mit niedrigem Insulinbedarf des Unternehmens Berlin Chemie. Der neue Pen bietet alle Vorteile einer flexiblen Insulintherapie, kombiniert mit modernem Design. Mit dem Pen können bis zu 25 Insulineinheiten des schnell wirksamen Insulinanalogons Liprolog® oder anderer Insuline des Unternehmens in 0,5er-Schritten appliziert werden. Der neue Pen verfügt über eine praktische Ein-Knopf-Bedienung für das Einstellen der Insulineinheit und die Injektion. Jede Einstellung wird mit einem Klickgeräusch bestätigt. Der Knopf kann ohne Fehldosierung oder Insulinverlust vor- und zurückgedreht werden, so der Hersteller. spa