ebenfalls im murinen Tiermodell – durch allergencodierte Plasmid DNA (pDNA) eine Immunisierung herbeizuführen. Theoretischer Ausgangspunkt ist die Tatsache, daß die intrakutan applizierte pDNA von Zellen inkorporiert und die entstehenden Peptide durch antigenpräsentierende Zellen dargestellt werden. Im Tierexperiment soll eine Abnahme der IgE- und Zunahme der IgG2a-Produktion als Zeichen für eine TH1-Zellantwort entstanden sein.

S. Adams, Boston, USA, berichtet über die theoretische Möglichkeit, Entzündungsreaktionen durch Gabe von Integrin-VLA4-Antagonisten zu hemmen. In der Integrin-Superfamilie der heterodimeren Zelladhäsionsrezeptoren spielt VLA4 eine große Rolle,

da sich dieser Rezeptor auf allen Leukozyten befindet. Über den Adhäsionsrezeptor VCAM auf den Endothelzellen besitzt er die Möglichkeit, eine Adhäsion am Endothel mit nachfolgender Transmigration und Rekrutierung von Leukozyten zum Entzündungsort zu vermitteln. Ebenso soll er durch ein Splicing Fibronectin aktivieren können, welches als Kostimulator von Eosinophilen und TH2-Zellen gilt. Im murinen Tierexperiment gibt es Hinweise auf einen möglichen vorteilhaften Effekt der Inhibition von VLA4 Integrin auf allergische Reaktionen.

Bei allen diesen alternativen Möglichkeiten der Immuntherapie, die auf einem theoretischen Konstrukt beruhen und die zumeist nur im Tierexpe-

riment untersucht wurden, bleibt die Frage der Übertragbarkeit auf das menschliche System. Auf dem Gebiet der Anti-IgE-Therapie und Peptidtherapie gibt es schon ernstzunehmende Versuche der Evaluierung ihrer Effektivität und Sicherheit im Vergleich zu Placebo, die anderen Therapieansätze scheinen davon noch weit entfernt.

Zusammenfassend zeichnet sich zur Zeit noch keine ernstzunehmende Alternative der Immuntherapie atopischer Erkrankungen zur klassischen Hyposensibilisierungsbehandlung ab.

Korrespondenzadresse:

Dr. med. K. Brockow, Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein, TUM, Biedersteiner Str. 29, D-80802 München.

Ein weiterer Baustein der allergologischen Diagnostik

Einer Studie an Heuschnupfenpatienten zufolge ist der neue „Nasale Applikator-Test (NAPT)“, der sich derzeit im Erprobungsstadium befindet, dem Provokationstest bezüglich seiner Aussagekraft ebenbürtig, doch für den Patienten wesentlich weniger belastend und gefährlich.

Neben gründlicher Anamnese gehören Haut- und Provokationstests zur Diagnostik der Rhinitis allergica. Gerade der nasale Provokationstest ist durch die Symptome an der Nase für Patienten sehr belastend. Zudem kann damit nur ein Allergen pro Tag getestet werden, der Test ist also für Arzt und Patient mit einem zum Teil erheblichen Zeitaufwand verbunden. Auf der Suche nach praktikableren Alternativen, stieß man jetzt auf den Nasalen Applikator-Test (NAPT). Mit dem Test werden die bei Allergikern in der Nasenschleimhaut befindlichen spezifischen

IgE-Antikörper gegen ein Allergen nachgewiesen. Dazu werden mehrere Allergenscheiben (CAPs) mit Hilfe einer Nasenzange in die Nase eingebracht. Auf der Matrix dieser CAPs sind die Allergene fest gebunden. Die in der Nasenschleimhaut befindlichen IgE-Antikörper diffundieren in die Matrix der Scheiben und gehen eine Bindung mit dem Allergen ein. Anschließend werden die IgE-Antikörper in vitro mit RAST oder ELISA nachgewiesen.

Der allergenhaltige Applikator enthält gleichzeitig mehrere Allergene und muß lediglich 5 Minuten unter

leichtem Druck auf die Nasenschleimhaut gepreßt werden. Da das Allergen nicht frei ist, kommt es im Gegensatz zum Provokationstest nicht zu Symptomen in der Nase, und es besteht keine Gefahr des anaphylaktischen Schocks. Derzeit wird ein Unternehmen gesucht, das Allergennasenzangen mit allen geläufigen Allergenen herstellt, um den Test möglichst bald auf den Markt bringen zu können.

Die Zuverlässigkeit des NAPT wurde in einer Studie an 59 Patienten mit Rhinitis allergica (Gräser, Birke und Milben) überprüft. 10 Nichtallergiker dienten als Kontrolle. Dabei betrug die Spezifität 97 % und die Sensitivität 88 % für alle Allergengruppen. Besonders positiv ist die äußerst geringe Anzahl von falsch positiven Ergebnissen (3%), die verdeutlicht, daß der Test eine tatsächlich bestehende Sensibilisierung des Erfolgsorgans aufzeigt. (kam)

Nach einem Vortrag von B. Hauswald, Dresden, im Rahmen des Kongresses Fortschritte der Dermatologie und Immunologie, Davos, Schweiz, 11.–15. September 1996.