Applikationsformen der spezifischen Immuntherapie

MATTHIAS V. KOPP, ANDREA HEINZMANN

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Freiburg

Allergo J 2007; 16: 570–5

Administration schedules of specific immunotherapy

Auf Seite 572 dieses Beitrages, der in Ausgabe 8/2007 von Allergo Journal abgedruckt wurde, hatte sich ein Fehler eingeschlichen. In der Tabelle 1 muss es für die Anwendungsform des Präparates Allergovit® korrekt „präsaisional oder ganzjährig“ heißen. Beim Erstabdruck war fälschlicherweise nur „präsaisional“ angegeben worden. Eben-

so nicht korrekt war in der Konsequenz der Eintrag „Erhaltungstherapie nicht vorgesehen“ in der Spalte „Erhaltungstherapie und Maximaldosis“.

Die entsprechende Zeile der Tabelle 1 ist nachfolgend nochmals korrekt wiedergegeben. Redaktion und Herausgeber bitten den Fehler zu entschuldigen.

Tabelle 1. Derzeit erhältliche Präparate zur subkutanen spezifischen Immuntherapie (SCIT) gegen inhalative Allergene (Rote Liste, Stand 2007)

Präparat	Anbieter	Depot	Natives Allergen/ Allergoid	Präsaisional/ ganzjährig	Dosissteigerung	Erhaltungstherapie und Maximaldosis
Allergovit®	Allergopharma	X	Allergoid	Präsaisional oder ganzjährig	7 Injektionen im Abstand von 7–14 Tagen	Alle 4–5 Wochen: Maximaldosis 0,6 ml (6.000 TU)